

**Boletín mensual de Intento de suicidio,  
Periodo 3,  
Semana epidemiológica 1 a semana epidemiológica 12 (29 de  
diciembre de 2019 al 21 de marzo) año 2020**



## Grafica

**Grafica 1.** Casos de *intento de suicidio*, año 2018, 2019 y 2020, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-12.

**Grafica 2.** Incidencia de intento de suicidio, según municipio de procedencia, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-12, 2020

**Grafica 3.** Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-12, 2020

## Tabla

**Tabla 1.** Comportamiento inusual de *intento de suicidio*, Putumayo, 2016 a 2020, semanas epidemiológicas 1-12

**Tabla 2.** Proporción de casos de intento de suicidio Putumayo, semanas epidemiológicas 1-12, 2020.

**Tabla 3.** Variables sociodemográficas de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-12, 2020

**Tabla 4.** Distribución de los tipos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-12, 2020



### Tabla de contenido


1. Intento de suicidio.....	04
1.1. Tendencia intento de suicidio,2017, 2018 y 2019,Putumayo, semanas epidemiológicas 1-12.....	04
1.2. Comportamiento inusual del evento de intento de suicidio, año 2016 a 2019 hasta semana epidemiológica 12.....	04
1.3. Proporción de casos de intento de suicidio por procedencia.....	05
1.4. Incidencia de casos de intento de suicidio, para el año 2020.....	06
1.5. Variables sociodemográficas del evento de intento de suicidio.....	06
1.6. Distribución de los tipos de intento de suicidio, Putumayo, año 2020.....	08
1.7. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-12, 2020.....	08

### 1. Intento de suicidio

#### 1.1. **Tendencia del evento de la intento de suicidio, año 2018, 2019 y 2020 hasta semana epidemiológica 12.**

Para el año 2018 hasta la semana epidemiológica 12 se notificaron a Sivigila 75 casos, para el año 2019 se notificaron 84 casos y para el año 2020 se han notificado 71 casos, lo que nos indica que se disminuyó la cantidad de casos que se han notificado en el año 2020 comparado con el año anterior, es importante resaltar que para el último año la mayor presencia de casos se dio en la semana epidemiológica 6 y la tendencia durante este año es a la disminución del número de los casos. Se observó una disminución del 15,5% de los casos en el año 2020 comparado con el año 2019. Se notifican en promedio cada semana 6 casos.

**Grafica 1. Casos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 12, 2018, 2019 y 2020**



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 12 de 2018 a 2020

#### 1.2. **Comportamiento inusual del evento de intento de suicidio, año 2017 a 2020 hasta semana epidemiológica 12.**

Para el año 2020 hasta la semana epidemiológica 12, el municipio de Mocoa presentó incremento del número de casos. Los municipios de Villagarzón, Orito y el departamento de Putumayo presentaron decremento de los casos. Los municipios de San Francisco, Puerto Asís, Leguízamo, Valle del Guamuéz, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Santiago, Colón, Sibundoy y San Miguel se mantuvieron estables.

**Tabla 1. Comportamiento inusual de intento de suicidio, Putumayo, 2017 a 2020, semanas epidemiológicas 1- 12**

MUNICIPIOS	PROMEDIO HISTORICO 2017-2019	OBSERVADO
MOCOA	11	16
PUERTO ASIS	13	12
VALLE DEL GUAMUEZ	9	7
VILLAGARZÓN	8	7
LEGUIZAMO	3	8
ORITO	8	11
SAN MIGUEL	5	3
SIBUNDOY	4	6
PUERTO GUZMAN	2	3
PUERTO CAICEDO	4	5
SANTIAGO	2	3
COLON	1	1
SAN FRANCISCO	2	2
<b>PUTUMAYO</b>	<b>74</b>	<b>84</b>

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 12 de 2017 a 2020

DECREMENTO	
INCREMENTO	
ESTABLE	

### 1.3. Proporción de casos de intento de suicidio por residencia

Según la proporción de casos de intento de suicidio para el año 2020 hasta semana epidemiológica 12, el primer lugar lo ocupan los municipios de Mocoa con 31,0% de los casos, seguido de Puerto Asís con 22,5 % de los casos, Valle del Guamuéz con 9,9% de los casos, Leguízamo con 8,5 % de los casos, Sibundoy con 7,0% de los casos, San Miguel con 5,6% de los casos, Orito con 4,2% de los casos, Santiago y Puerto Caicedo con 2,8% de los casos cada uno, Colón y Villagarzón con 1,4% de los casos cada uno. Los demás municipios no presentaron casos.

**Tabla 2. Proporción de casos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 12, 2020**

Municipio de RESIDENCIA	Total	Proporción
<b>MOCOA</b>	22	31.0
<b>PUERTO ASIS</b>	16	22.5
<b>VALLE DEL GUAMUEZ</b>	7	9.9


LEGUIZAMO	6	8.5
SIBUNDOY	5	7.0
SAN MIGUEL	4	5.6
ORITO	3	4.2
SANTIAGO	2	2.8
PUERTO CAICEDO	2	2.8
VILLAGARZON	1	1.4
COLON	1	1.4
OTRO DEPTO	2	2.8
<b>Total general</b>	<b>71</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 12- 2020

#### 1.4. Incidencia de casos de intento de suicidio, para el año 2020.

La incidencia más alta de intento de suicidio en el año 2020 hasta semana epidemiológica 12, la presentó **Mocoa** con 37,3 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, seguido de **Sibundoy** con 32,3 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Santiago** con 27,4 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Puerto Asís** con 23,8% casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **San Miguel** con 20,6% casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Leguízamo** con 20,3% casos nuevos por cada 100.000 habitantes y **Valle del Guamuez** con 20,2% casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Los demás municipios presentan incidencias más bajas que la del departamento que es de 19,2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. El municipio con menor incidencia es Villagarzón con 4,2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Colombia presenta una incidencia de 12,2 casos nuevos por 100.000 habitantes.

Grafica 2. Incidencia de intento de suicidio, según municipio de procedencia, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-12, 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 12- 2020

### 1.5. Variables sociodemográficas del evento de intento de suicidio

Los casos notificados de intento de suicidio corresponden en mayor porcentaje al sexo femenino. Según el área de residencia la mayoría vive en la cabecera municipal, seguida de la zona rural dispersa y en tercer lugar en el centro poblado. De acuerdo al tipo de régimen en primer lugar las personas estaban afiliadas al régimen subsidiado, seguido de régimen de excepción y no asegurado. Según la pertenencia étnica la mayoría pertenecen a otra etnia, seguidos de etnia indígena. Los grupos de edad se encuentran en su mayoría en el rango de 15 a 19 años, seguido del grupo de 20 a 24 años, 10 a 14 años y el grupo de edad de 25 a 29 años, los demás grupos con menor proporción de casos.

**Tabla 3. Variables sociodemográficas de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 12, 2020**

VARIABLE	CATEGORIA	CASOS	%
SEXO	FEMENINO	41	57.7
	MASCULINO	30	42.3
AREA DE RESIDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	50	70.4
	CENTRO POBLADO	3	4.2
	RURAL DISPERSA	18	25.4
TIPO DE REGIMEN	SUBSIDIADO	58	81.7
	CONTRIBUTIVO	2	2.8
	NO ASEGURADO	5	7.0
	EXCEPCION	5	7.0
	INDETERMINADO/PENDIENTE	1	1.4
PERTENENCIA ETNICA	OTROS	64	90.1
	INDIGENA	6	8.5
	AFROCOLOMBIANO	1	1.4
	ROM GITANO	0	0.0
	RAIZAL	0	0.0
	PALENQUERO	0	0.0
GRUPOS DE EDAD	0-4	0	0.0
	5-9	0	0.0
	10-14	10	14.1
	15-19	21	29.6
	20-24	12	16.9
	25-29	9	12.7
	30-34	6	8.5
	35-39	2	2.8
	40-44	5	7.0
	45-49	2	2.8
	50-54	3	4.2
	55-59	0	0.0
60-64	0	0.0	

	65-69	1	1.4
	70-74	0	0.0
	75-79	0	0.0
	80-84	0	0.0
	85-89	0	0.0

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 12- 2020

#### 1.6. Distribución del número de intentos previos de intento de suicidio, Putumayo, año 2020

De los 71 casos notificados, el 36,6(26 casos) de los casos si tuvieron intentos previos y el 63,4% (45 casos) no tuvieron intentos previos. Según la distribución del número de intentos previos, el primer lugar es una vez con 15 casos (57,7%).

Tabla4.Distribución del número de intentos previos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-12, 2020


Numero de Intentos	Total	%
1 vez	15	57.7
2 veces	8	30.8
3 veces	1	3.8
Más de 3 veces	1	3.8
Desconocido	1	3.8
<b>Total general</b>	<b>26</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 12- 2020

#### 1.7. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, año 2020

De los 71 casos notificados, el 67,6% (48casos) de los casos tuvieron intentos de suicidio mediante el mecanismo de intoxicación, el 2,80 % (19 casos) tuvieron intentos de suicidio con arma cortopunzante, el 4,2 % (3 casos) tuvieron intentos de suicidio a través de ahorcamiento y el 1,4 % (1 caso) tuvieron intentos de suicidio a través de lanzamiento a vehículo, los demás mecanismos no tuvieron casos. De los 48 casos de intentos de suicidio por intoxicación, la mayoría utilizó plaguicidas (28 casos), seguidos de medicamentos (17 casos).

**Grafica3. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-12, 2020**



Fuente: Siviigila a semana epidemiológica 12- 2020

**Elaboró:** Alexandra Mora Carvajal  
Epidemióloga de apoyo

**Revisó y aprobó:** Andrea Morillo Gómez  
P. E. área de Epidemióloga SSD