

**Boletín mensual de Intento de suicidio,
Periodo 7,
Semana epidemiológica 1 a semana epidemiológica 28 (29 de
diciembre de 2019 al 11 de julio) año 2020**



Grafica

Grafica 1. Casos de *intento de suicidio*, año 2018, 2019 y 2020, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-28

Grafica 2. Incidencia de intento de suicidio, según municipio de procedencia, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-28, 2020

Grafica 3. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-28, 2020

Tabla

Tabla 1. Comportamiento inusual de *intento de suicidio*, Putumayo, 2016 a 2020, semanas epidemiológicas 1-28

Tabla 2. Proporción de casos de intento de suicidio Putumayo, semanas epidemiológicas 1-28, 2020.

Tabla 3. Variables socio-demográficas de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-28, 2020

Tabla 4. Distribución de los tipos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-28, 2020



Tabla de contenido


1. Intento de suicidio.....	04
1.1. Tendencia intento de suicidio, 2017, 2018 y 2019, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-28.....	04
1.2. Comportamiento inusual del evento de intento de suicidio, año 2016 a 2019 hasta semana epidemiológica 28.....	04
1.3. Proporción de casos de intento de suicidio por procedencia.....	05
1.4. Incidencia de casos de intento de suicidio, para el año 2020.....	06
1.5. Variables socio-demográficas del evento de intento de suicidio.....	06
1.6. Distribución de los tipos de intento de suicidio, Putumayo, año 2020.....	08
1.7. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-28, 2020.....	08

1. Intento de suicidio

1.1. **Tendencia del evento de la intento de suicidio, año 2018, 2019 y 2020 hasta semana epidemiológica 28.**

Para el año 2018 hasta la semana epidemiológica 28 se notificaron a Sivigila 172 casos, para el año 2019 se notificaron 206 casos y para el año 2020 se han notificado 167 casos, lo que nos indica que se disminuyó la cantidad de casos que se han notificado en el año 2020 comparado con el año anterior, es importante resaltar que para el último año la mayor presencia de casos se dio en la semana epidemiológica 27 y la tendencia durante este año es a mantener el número de los casos. Se observó una disminución del 18,9% de los casos en el año 2020 comparado con el año 2019. Se notifican en promedio cada semana 6 casos.

Grafica 1. Casos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 28, 2018, 2019 y 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 28 de 2018 a 2020

1.2. **Comportamiento inusual del evento de intento de suicidio, año 2016 a 2019 hasta semana epidemiológica 28.**

Para el año 2020 hasta la semana epidemiológica 28, los municipios de Puerto Asís y Sibundoy presentaron incremento del número de casos. El municipio de Orito y el departamento de Putumayo presentaron decremento de los casos. Los demás municipios se mantuvieron estables.

Tabla 1. Comportamiento inusual de intento de suicidio, Putumayo, 2016 a 2019, semanas epidemiológicas 1- 28

MUNICIPIOS	PROMEDIO HISTORICO 2016-2019	OBSERVADO
MOCOA	29	33
PUERTO ASIS	33	40
VALLE DEL GUAMUEZ	17	16
VILLAGARZÓN	17	12
LEGUIZAMO	11	13
ORITO	19	13
SAN MIGUEL	10	7
SIBUNDOY	7	12
PUERTO GUZMAN	6	3
PUERTO CAICEDO	8	4
SANTIAGO	6	6
COLON	3	2
SAN FRANCISCO	3	2
PUTUMAYO	168	163

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 28 de 2016 a 2019

DECREMENTO	
INCREMENTO	
ESTABLE	

1.3. Proporción de casos de intento de suicidio por residencia

Según la proporción de casos de intento de suicidio para el año 2020 hasta semana epidemiológica 28, el primer lugar lo ocupa el municipio de Puerto Asís con 24,0% de los casos, seguido de Mocoa con 19,8 % de los casos, Valle del Guamuéz con 9,6% de los casos, Leguízamo con 7,8% de los casos, Orito con 7,8% de los casos, Sibundoy y Villagarzón con 7,2% de los casos cada uno, San Miguel con 4,2% de los casos, Santiago con 3,6% de los casos, Puerto Caicedo con 2,4% de los casos, Puerto Guzmán con 1,8% de los casos y San Francisco y Colón con 1,2% de los casos.

Tabla 2. Proporción de casos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 28, 2020

Municipio de RESIDENCIA	Total	Proporción
PUERTO ASIS	40	24.0
MOCOA	33	19.8
VALLE DEL GUAMUEZ	16	9.6
LEGUIZAMO	13	7.8


ORITO	13	7.8
SIBUNDOY	12	7.2
VILLAGARZON	12	7.2
SAN MIGUEL	7	4.2
SANTIAGO	6	3.6
PUERTO CAICEDO	4	2.4
PUERTO GUZMAN	3	1.8
SAN FRANCISCO	2	1.2
COLON	2	1.2
OTRO DEPTO	4	2.4
Total general	167	100.0

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 28- 2020

1.4. Incidencia de casos de intento de suicidio, para el año 2020.

La incidencia más alta de intento de suicidio en el año 2020 hasta semana epidemiológica 28, la presentó **Santiago** con 82,1 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, seguido de **Sibundoy** con 77,6 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Puerto Asís** con 59,5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Mocoa** con 56,0% casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Villagarzón** con 49,8% casos nuevos por cada 100.000 habitantes y **Valle del Guamuez** con 46,2% casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Los demás municipios presentan incidencias más bajas que la del departamento que es de **45,4** casos nuevos por cada 100.000 habitantes. El municipio con menor incidencia es **Puerto Guzmán** con 8,2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Colombia presenta una incidencia de **27,9** casos nuevos por 100.000 habitantes.

Grafica 2. Incidencia de intento de suicidio, según municipio de procedencia, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-28, 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 28- 2020

1.5. Variables socio-demográficas del evento de intento de suicidio

Los casos notificados de intento de suicidio corresponden en mayor porcentaje al sexo femenino. Según el área de residencia la mayoría vive en la cabecera municipal, seguida de la zona rural dispersa y en tercer lugar en el centro poblado. De acuerdo al tipo de régimen en primer lugar las personas estaban afiliadas al régimen subsidiado, seguido de no asegurado y régimen de excepción. Según la pertenencia étnica la mayoría pertenecen a otra etnia, seguidos de etnia indígena. Los grupos de edad se encuentran en su mayoría en el rango de 15 a 19 años, seguido del grupo de 20 a 24 años, 10 a 14 años y el grupo de edad de 25 a 29 años, los demás grupos con menor proporción de casos.

Tabla 3. Variables socio-demográficas de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 28, 2020

VARIABLE	CATEGORÍA	CASOS	%
SEXO	FEMENINO	97	58.1
	MASCULINO	70	41.9
ÁREA DE RESIDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	104	62.3
	CENTRO POBLADO	11	6.6
	RURAL DISPERSA	52	31.1
TIPO DE RÉGIMEN	SUBSIDIADO	139	83.2
	CONTRIBUTIVO	7	4.2
	NO ASEGURADO	11	6.6
	EXCEPCIÓN	9	5.4
	INDETERMINADO/PENDIENTE	1	0.6

PERTENENCIA ÉTNICA	OTROS	146	87.4
	INDÍGENA	18	10.8
	AFROCOLOMBIANO	3	1.8
	ROM GITANO	0	0.0
	RAIZAL	0	0.0
	PALENQUERO	0	0.0
GRUPOS DE EDAD	0-4	0	0.0
	5-9	0	0.0
	10-14	22	13.2
	15-19	55	32.9
	20-24	32	19.2
	25-29	22	13.2
	30-34	13	7.8
	35-39	4	2.4
	40-44	6	3.6
	45-49	5	3.0
	50-54	5	3.0
	55-59	1	0.6
	60-64	0	0.0
	65-69	2	1.2
	70-74	0	0.0
	75-79	0	0.0
80-84	0	0.0	
85-89	0	0.0	

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 28- 2020

1.6. Distribución del número de intentos previos de intento de suicidio, Putumayo, año 2020

De los 167 casos notificados, el 33,5 (56 casos) de los casos si tuvieron intentos previos y el 66,5% (111 casos) no tuvieron intentos previos. Según la distribución del número de intentos previos, el primer lugar es una vez con 25 casos (44,6%), seguido de dos veces con 14 casos (25,0%).

Tabla4. Distribución del número de intentos previos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-28, 2020


Numero de Intentos	Total	%
1 vez	25	44.6
2 veces	14	25.0
3 veces	5	8.9
Más de 3 veces	8	14.3
Desconocido	4	7.1
Total con intento	56	100.0

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 28- 2020

1.7. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, año 2020

De los 167 casos notificados, el 72,5% (121 casos) de los casos tuvieron intentos de suicidio mediante el mecanismo de intoxicación, el 21,0 % (35 casos) tuvieron intentos de suicidio con arma corto-punzante, el 4,2 % (7 casos) tuvieron intentos de suicidio a través de ahorcamiento o asfixia, el 1,8 % (3 casos) tuvieron intentos de suicidio a través de lanzamiento al vacío y el 0,6 % (1 caso) tuvieron intentos de suicidio a través de lanzamiento a vehículo; los demás mecanismos no tuvieron casos. De los 121 casos de intentos de suicidio por intoxicación, la mayoría utilizó plaguicidas (69 casos), seguidos de medicamentos (44 casos).

Grafica3. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-28, 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 28- 2020

Elaboró: Alexandra Mora Carvajal
Epidemióloga de apoyo

Revisó y aprobó: Andrea Morillo Gómez
P. E. área de Epidemiología SSD