

**Boletín mensual de Intento de suicidio,
Periodo 8,
Semana epidemiológica 1 a semana epidemiológica 32 (29 de
diciembre de 2019 al 8 de agosto) año 2020**



Grafica

Grafica 1. Casos de *intento de suicidio*, año 2018, 2019 y 2020, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-32

Grafica 2. Incidencia de intento de suicidio, según municipio de procedencia, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-32, 2020

Grafica 3. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-32, 2020

Tabla

Tabla 1. Comportamiento inusual de *intento de suicidio*, Putumayo, 2016 a 2020, semanas epidemiológicas 1-32

Tabla 2. Proporción de casos de intento de suicidio Putumayo, semanas epidemiológicas 1-32, 2020.

Tabla 3. Variables socio-demográficas de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-32, 2020

Tabla 4. Distribución de los tipos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-32, 2020



Tabla de contenido


- 1. *Intento de suicidio*.....04
 - 1.1. *Tendencia intento de suicidio, 2017, 2018 y 2019, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-32*.....04
 - 1.2. *Comportamiento inusual del evento de intento de suicidio, año 2016 a 2019 hasta semana epidemiológica 32*.....04
 - 1.3. *Proporción de casos de intento de suicidio por procedencia*.....05
 - 1.4. *Incidencia de casos de intento de suicidio, para el año 2020*.....06
 - 1.5. *Variables socio-demográficas del evento de intento de suicidio*.....06
 - 1.6. *Distribución de los tipos de intento de suicidio, Putumayo, año 2020*.....08
 - 1.7. *Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-32, 2020*.....08

1. Intento de suicidio

1.1. **Tendencia del evento de la intento de suicidio, año 2018, 2019 y 2020 hasta semana epidemiológica 32.**

Para el año 2018 hasta la semana epidemiológica 32 se notificaron a Sivigila 198 casos, para el año 2019 se notificaron 231 casos y para el año 2020 se han notificado 189 casos, lo que nos indica que se disminuyó la cantidad de casos que se han notificado en el año 2020 comparado con el año anterior, es importante resaltar que para el último año la mayor presencia de casos se dio en la semana epidemiológica 27 y la tendencia durante este año es a disminuir el número de los casos. Se observó una disminución del 18,2% de los casos en el año 2020 comparado con el año 2019. Se notifican en promedio cada semana 6 casos.

Grafica 1. Casos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 28, 2018, 2019 y 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 32 de 2018 a 2020

1.2. **Comportamiento inusual del evento de intento de suicidio, año 2016 a 2019 hasta semana epidemiológica 32.**

Para el año 2020 hasta la semana epidemiológica 32, los municipios de Mocoa, Puerto Asís y Sibundoy presentaron incremento del número de casos. Los municipios de Villagarzón, Orito y el departamento de Putumayo presentaron decremento de los casos. Los demás municipios se mantuvieron estables.

Tabla 1. Comportamiento inusual de intento de suicidio, Putumayo, 2016 a 2019, semanas epidemiológicas 1- 32

MUNICIPIOS	PROMEDIO HISTORICO 2016-2019	OBSERVADO 2020
MOCOA	35	40
PUERTO ASIS	37	46
VALLE DEL GUAMUEZ	19	16
VILLAGARZÓN	19	13
LEGUIZAMO	13	13
ORITO	22	14
SAN MIGUEL	12	8
SIBUNDOY	8	16
PUERTO GUZMAN	7	3
PUERTO CAICEDO	8	4
SANTIAGO	7	7
COLON	4	2
SAN FRANCISCO	3	3
PUTUMAYO	193	185

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 32 de 2016 a 2019

DECREMENTO	
INCREMENTO	
ESTABLE	

1.3. Proporción de casos de intento de suicidio por residencia

Según la proporción de casos de intento de suicidio para el año 2020 hasta semana epidemiológica 32, el primer lugar lo ocupa el municipio de Puerto Asís con 23,3% de los casos, seguido de Mocoa con 21,2 % de los casos, Sibundoy y Valle del Guamuéz con 8,5% de los casos cada uno, Orito con 7,4% de los casos, Leguízamo y Villagarzón con 6,9% de los casos cada uno, San Miguel con 4,2% de los casos, Santiago con 3,7% de los casos, Puerto Caicedo con 2,1% de los casos, Puerto Guzmán y San Francisco con 1,6% de los casos y Colón con 1,1% de los casos.

Tabla 2. Proporción de casos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 32, 2020

Municipio de RESIDENCIA	Total	Proporción
PUERTO ASIS	46	24,3
MOCOA	40	21,2
SIBUNDOY	16	8,5
VALLE DEL GUAMUEZ	16	8,5


ORITO	14	7,4
LEGUIZAMO	13	6,9
VILLAGARZON	13	6,9
SAN MIGUEL	8	4,2
SANTIAGO	7	3,7
PUERTO CAICEDO	4	2,1
OTRO DEPTO	4	2,1
PUERTO GUZMAN	3	1,6
SAN FRANCISCO	3	1,6
COLON	2	1,1
Total general	189	100,0

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 32- 2020

1.4. Incidencia de casos de intento de suicidio, para el año 2020.

La incidencia más alta de intento de suicidio en el año 2020 hasta semana epidemiológica 32, la presentó **Santiago** con 95,8 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, seguido de **Leguízamo** con 84,0 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Puerto Asís** con 68,4 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Mocoa** con 67,9% casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Valle del Guamuez** con 54,2% casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Villagarzón** con 54,0% casos nuevos por cada 100.000 habitantes y **San Francisco** con 53,9% casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Los demás municipios presentan incidencias más bajas que la del departamento que es de **51,5** casos nuevos por cada 100.000 habitantes. El municipio con menor incidencia es **Puerto Guzmán** con 8,2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Colombia presenta una incidencia de **32,1** casos nuevos por 100.000 habitantes.

Grafica 2. Incidencia de intento de suicidio, según municipio de procedencia, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-32, 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 32- 2020

1.5. Variables socio-demográficas del evento de intento de suicidio

Los casos notificados de intento de suicidio corresponden en mayor porcentaje al sexo femenino. Según el área de residencia la mayoría vive en la cabecera municipal, seguida de la zona rural dispersa y en tercer lugar en el centro poblado. De acuerdo al tipo de régimen en primer lugar las personas estaban afiliadas al régimen subsidiado, seguido de no asegurado y régimen de excepción. Según la pertenencia étnica la mayoría pertenecen a otra etnia, seguidos de etnia indígena. Los grupos de edad se encuentran en su mayoría en el rango de 15 a 19 años, seguido del grupo de 20 a 24 años, 10 a 14 años y el grupo de edad de 25 a 29 años, los demás grupos con menor proporción de casos.

Tabla 3. Variables socio-demográficas de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 32, 2020

VARIABLE	CATEGORÍA	CASOS	%
SEXO	FEMENINO	108	57,1
	MASCULINO	81	42,9
ÁREA DE RESIDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	118	62,4
	CENTRO POBLADO	12	6,3
	RURAL DISPERSA	59	31,2
TIPO DE RÉGIMEN	SUBSIDIADO	154	81,5
	CONTRIBUTIVO	8	4,2
	NO ASEGURADO	15	7,9

PERTENENCIA ÉTNICA	EXCEPCIÓN	11	5,8
	INDETERMINADO/PENDIENTE	1	0,5
	OTROS	165	87,3
	INDÍGENA	20	10,6
	AFROCOLOMBIANO	4	2,1
	ROM GITANO	0	0,0
	RAIZAL	0	0,0
	PALENQUERO	0	0,0
GRUPOS DE EDAD	0-4	0	0,0
	5-9	2	1,1
	10-14	25	13,2
	15-19	59	31,2
	20-24	42	22,2
	25-29	23	12,2
	30-34	15	7,9
	35-39	4	2,1
	40-44	6	3,2
	45-49	5	2,6
	50-54	5	2,6
	55-59	1	0,5
	60-64	0	0,0
	65-69	2	1,1
	70-74	0	0,0
	75-79	0	0,0
	80-84	0	0,0
85-89	0	0,0	

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 32- 2020

1.6. Distribución del número de intentos previos de intento de suicidio, Putumayo, año 2020

De los 189 casos notificados, el 32,8 (62 casos) de los casos si tuvieron intentos previos y el 67,2% (127 casos) no tuvieron intentos previos. Según la distribución del número de intentos previos, el primer lugar es una vez con 27 casos (43,5%), seguido de dos veces con 18 casos (29,0%).

Tabla4. Distribución del número de intentos previos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-32, 2020


Numero de Intentos	Total	%
1 vez	27	43,5
2 veces	18	29,0
3 veces	5	8,1
Más de 3 veces	8	12,9
Desconocido	4	6,5
Total con intentos	62	100,0

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 32- 2020

1.7. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, año 2020

De los 189 casos notificados, el 70,9% (134 casos) de los casos tuvieron intentos de suicidio mediante el mecanismo de intoxicación, el 21,7 % (41 casos) tuvieron intentos de suicidio con arma corto-punzante, el 4,2 % (8 casos) tuvieron intentos de suicidio a través de ahorcamiento o asfixia, el 2,1 % (4 casos) tuvieron intentos de suicidio a través de lanzamiento al vacío y el 0,5 % (1 caso) tuvieron intentos de suicidio a través de lanzamiento a vehículo y por arma de fuego; los demás mecanismos no tuvieron casos. De los 134 casos de intentos de suicidio por intoxicación, la mayoría utilizó plaguicidas (77 casos), seguidos de medicamentos (48 casos).

Grafica3. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-32, 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 32- 2020

Elaboró: Alexandra Mora Carvajal
Epidemióloga de apoyo

Revisó y aprobó: Andrea Morillo Gómez
P. E. área de Epidemióloga SSD