

**Boletín mensual de Intento de suicidio,
Periodo 9,
Semana epidemiológica 1 a semana epidemiológica 36 (29 de
diciembre de 2019 al 5 de septiembre) año 2020**



Grafica

Grafica 1. Casos de *intento de suicidio*, año 2018,2019 y 2020, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-36

Grafica 2. Incidencia de intento de suicidio, según municipio de procedencia, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-36, 2020

Grafica 3. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-36, 2020

Tabla

Tabla 1. Comportamiento inusual de *intento de suicidio*, Putumayo, 2016 a 2020, semanas epidemiológicas 1- 36

Tabla 2. Proporción de casos de intento de suicidio Putumayo, semanas epidemiológicas 1-36, 2020.

Tabla 3. Variables socio-demográficas de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-36, 2020

Tabla 4. Distribución de los tipos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-36, 2020



Tabla de contenido


1. Intento de suicidio.....	04
1.1. Tendencia intento de suicidio, 2017, 2018 y 2019, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-36.....	04
1.2. Comportamiento inusual del evento de intento de suicidio, año 2016 a 2019 hasta semana epidemiológica 36	04
1.3. Proporción de casos de intento de suicidio por procedencia.....	05
1.4. Incidencia de casos de intento de suicidio, para el año 2020.....	06
1.5. Variables socio-demográficas del evento de intento de suicidio.....	06
1.6. Distribución de los tipos de intento de suicidio, Putumayo, año 2020.....	08
1.7. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-36, 2020.....	08

1. Intento de suicidio

1.1. **Tendencia del evento de la intento de suicidio, año 2018, 2019 y 2020 hasta semana epidemiológica 36.**

Para el año 2018 hasta la semana epidemiológica 36 se notificaron a Sivigila 231 casos, para el año 2019 se notificaron 264 casos y para el año 2020 se han notificado 211 casos, lo que nos indica que se disminuyó la cantidad de casos que se han notificado en el año 2020 comparado con el año anterior, es importante resaltar que para el último año la mayor presencia de casos se dio en la semana epidemiológica 27 y la tendencia durante este año es a disminuir el número de los casos. Se observó una disminución del 20,1% de los casos en el año 2020 comparado con el año 2019. Se notifican en promedio cada semana 6 casos.

Grafica 1. Casos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 36, 2018, 2019 y 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 36 de 2018 a 2020

1.2. **Comportamiento inusual del evento de intento de suicidio, año 2016 a 2019 hasta semana epidemiológica 36.**

Para el año 2020 hasta la semana epidemiológica 36, los municipios de Mocoa, Puerto Asís y Sibundoy presentaron incremento del número de casos. Los municipios de Villagarzón, Orito y el departamento de Putumayo presentaron decremento de los casos. Los demás municipios se mantuvieron estables.

Tabla 1. Comportamiento inusual de intento de suicidio, Putumayo, 2016 a 2019, semanas epidemiológicas 1- 36

MUNICIPIOS	PROMEDIO HISTORICO 2016-2019	OBSERVADO 2020
MOCOA	41	42
PUERTO ASIS	42	45
VALLE DEL GUAMUEZ	25	17
VILLAGARZÓN	22	16
LEGUIZAMO	15	15
ORITO	24	18
SAN MIGUEL	14	11
SIBUNDOY	9	19
PUERTO GUZMAN	9	4
PUERTO CAICEDO	9	4
SANTIAGO	7	9
COLON	5	4
SAN FRANCISCO	3	3
PUTUMAYO	225	207

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 36 de 2016 a 2019

DECREMENTO	
INCREMENTO	
ESTABLE	

1.3. Proporción de casos de intento de suicidio por residencia

Según la proporción de casos de intento de suicidio para el año 2020 hasta semana epidemiológica 36, el primer lugar lo ocupa el municipio de Puerto Asís con 21,3% de los casos, seguido de Mocoa con 19,9 % de los casos, Sibundoy con 9,0% de los casos, Orito con 8,5% de los casos, Valle del Guamuez con 8,1% de los casos, Villagarzón con 7,6% de los casos, Leguizamo con 7,1% de los casos, San Miguel con 5,2% de los casos, Santiago con 4,3% de los casos, Colón, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán con 1,9% de los casos cada uno y San Francisco con 1,4% de los casos.

Tabla 2. Proporción de casos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 36, 2020

Municipio de RESIDENCIA	Total	Proporción
PUERTO ASIS	45	21,3
MOCOA	42	19,9
SIBUNDOY	19	9,0
ORITO	18	8,5


VALLE DEL GUAMUEZ	17	8,1
VILLAGARZON	16	7,6
LEGUIZAMO	15	7,1
SAN MIGUEL	11	5,2
SANTIAGO	9	4,3
COLON	4	1,9
PUERTO CAICEDO	4	1,9
PUERTO GUZMAN	4	1,9
SAN FRANCISCO	3	1,4
OTRO DEPTO	4	1,9
Total general	211	100,0

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 32- 2020

1.4. Incidencia de casos de intento de suicidio, para el año 2020.

La incidencia más alta de intento de suicidio en el año 2020 hasta semana epidemiológica 36, la presentó **Santiago** con 123,2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, seguido de **Sibundoy** con 122,8 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Colón** con 72,3 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Mocoa** con 71,3% casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Puerto Asís** con 67,0% casos nuevos por cada 100.000 habitantes y **Villagarzón** con 66,4% casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Los demás municipios presentan incidencias más bajas que la del departamento que es de **57,6** casos nuevos por cada 100.000 habitantes. El municipio con menor incidencia es **Puerto Guzmán** con 10,9 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Colombia presenta una incidencia de **36,1** casos nuevos por 100.000 habitantes.

Grafica 2. Incidencia de intento de suicidio, según municipio de procedencia, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-36, 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 36- 2020

1.5. Variables socio-demográficas del evento de intento de suicidio

Los casos notificados de intento de suicidio corresponden en mayor porcentaje al sexo femenino. Según el área de residencia la mayoría vive en la cabecera municipal, seguida de la zona rural dispersa y en tercer lugar en el centro poblado. De acuerdo al tipo de régimen en primer lugar las personas estaban afiliadas al régimen subsidiado, seguido de no asegurado y régimen de excepción. Según la pertenencia étnica la mayoría pertenecen a otra etnia, seguidos de etnia indígena. Los grupos de edad se encuentran en su mayoría en el rango de 15 a 19 años, seguido del grupo de 20 a 24 años, 10 a 14 años y el grupo de edad de 25 a 29 años, los demás grupos con menor proporción de casos.

Tabla 3. Variables socio-demográficas de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 36, 2020

VARIABLE	CATEGORÍA	CASOS	%
SEXO	FEMENINO	123	58,3
	MASCULINO	88	41,7
ÁREA DE RESIDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	132	62,6
	CENTRO POBLADO	12	5,7
	RURAL DISPERSA	67	31,8
TIPO DE RÉGIMEN	SUBSIDIADO	171	81,0

PERTENENCIA ÉTNICA	CONTRIBUTIVO	9	4,3
	NO ASEGURADO	16	7,6
	EXCEPCIÓN	14	6,6
	INDETERMINADO/PENDIENTE	1	0,5
	OTROS	184	87,2
	INDÍGENA	23	10,9
	AFROCOLOMBIANO	4	1,9
	ROM GITANO	0	0,0
	RAIZAL	0	0,0
	PALENQUERO	0	0,0
GRUPOS DE EDAD	0-4	0	0,0
	5-9	2	0,9
	10-14	24	11,4
	15-19	72	34,1
	20-24	48	22,7
	25-29	24	11,4
	30-34	17	8,1
	35-39	4	1,9
	40-44	6	2,8
	45-49	5	2,4
	50-54	6	2,8
	55-59	1	0,5
	60-64	0	0,0
	65-69	2	0,9
	70-74	0	0,0
	75-79	0	0,0
80-84	0	0,0	
85-89	0	0,0	

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 36- 2020

1.6. Distribución del número de intentos previos de intento de suicidio, Putumayo, año 2020

De los 211 casos notificados, el 33,2 (70 casos) de los casos si tuvieron intentos previos y el 66,8% (141 casos) no tuvieron intentos previos. Según la distribución del número de intentos previos, el primer lugar es una vez con 32 casos (45,7%), seguido de dos veces con 21 casos (30,0%).

Tabla4. Distribución del número de intentos previos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-36, 2020

Numero de Intentos	Total	%
1 vez	32	45,7
2 veces	21	30,0
3 veces	5	7,1
Más de 3 veces	8	11,4


Desconocido	4	5,7
Total con intentos	70	100,0

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 36- 2020

1.7. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, año 2020

De los 211 casos notificados, el 71,1% (150 casos) de los casos tuvieron intentos de suicidio mediante el mecanismo de intoxicación, el 20,9 % (44 casos) tuvieron intentos de suicidio con arma corto-punzante, el 4,3 % (9 casos) tuvieron intentos de suicidio a través de ahorcamiento o asfixia, el 2,4 % (5 casos) tuvieron intentos de suicidio a través de lanzamiento al vacío, el 0,9 % (2 casos) tuvieron intentos de suicidio a través de arma de fuego y el 0,5 % (1 caso) tuvo intento de suicidio a través de lanzamiento a vehículo; los demás mecanismos no tuvieron casos. De los 150 casos de intentos de suicidio por intoxicación, la mayoría utilizó plaguicidas (88 casos), seguidos de medicamentos (53 casos).

Grafica3. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-36, 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 36- 2020

Elaboró: Alexandra Mora Carvajal
Epidemióloga de apoyo

Revisó y aprobó: Andrea Morillo Gómez
P. E. área de Epidemióloga SSD