

**Boletín mensual de Intento de suicidio,  
Periodo 10,  
Semana epidemiológica 1 a semana epidemiológica 40 (29 de  
diciembre de 2019 al 3 de octubre) año 2020**



## Grafica

- Grafica 1.** Casos de *intento de suicidio*, año 2018,2019 y 2020, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-40
- Grafica 2.** Incidencia de intento de suicidio, según municipio de procedencia, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-40, 2020
- Grafica 3.** Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-40, 2020

## Tabla

- Tabla 1.** Comportamiento inusual de *intento de suicidio*, Putumayo, 2016 a 2020, semanas epidemiológicas 1- 40
- Tabla 2.** Proporción de casos de intento de suicidio Putumayo, semanas epidemiológicas 1-40, 2020.
- Tabla 3.** Variables sociodemográficas de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-40, 2020
- Tabla 4.** Distribución de los tipos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-40, 2020



**Tabla de contenido**

1. *Intento de suicidio*.....04

1.1. *Tendencia intento de suicidio, 2017, 2018 y 2019, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-40*.....04

1.2. *Comportamiento inusual del evento de intento de suicidio, año 2016 a 2019 hasta semana epidemiológica 40* ... .. 04

1.3. *Proporción de casos de intento de suicidio por procedencia*.....05

1.4. *Incidencia de casos de intento de suicidio, para el año 2020*..... 06

1.5. *Variables sociodemográficas del evento de intento de suicidio*..... 06

1.6. *Distribución de los tipos de intento de suicidio, Putumayo, año 2020*..... 08


1.7. *Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-40, 2020*..... 08

### 1. Intento de suicidio

#### 1.1. **Tendencia del evento de intento de suicidio, año 2018, 2019 y 2020 hasta semana epidemiológica 40.**

Para el año 2018 hasta la semana epidemiológica 40 se notificaron a Sivigila 254 casos, para el año 2019 se notificaron 295 casos y para el año 2020 se han notificado 235 casos, lo que nos indica que se disminuyó la cantidad de casos que se han notificado en el año 2020 comparado con el año anterior, es importante resaltar que para el último año la mayor presencia de casos se dio en la semana epidemiológica 27 y la tendencia durante este año es a disminuir el número de los casos. Se observó una disminución del 20,3% de los casos en el año 2020 comparado con el año 2019. Se notifican en promedio cada semana 6 casos.

**Grafica 1. Casos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 40, 2018, 2019 y 2020**



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 40 de 2018 a 2020

#### 1.2. **Comportamiento inusual del evento de intento de suicidio, año 2016 a 2019 hasta semana epidemiológica 40.**

Para el año 2020 hasta la semana epidemiológica 40, los municipios de Puerto Asís y Sibundoy presentaron incremento del número de casos. Los municipios de Valle del Guamuez, Villagarzón, Orito, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo y el departamento de Putumayo presentaron decremento de los casos. Los demás municipios se mantuvieron estables.

**Tabla 1. Comportamiento inusual de intento de suicidio, Putumayo, 2016 a 2019, semanas epidemiológicas 1- 40**

MUNICIPIOS	PROMEDIO HISTORICO 2016-2019	OBSERVADO 2020
MOCOA	45	46
PUERTO ASIS	47	53
VALLE DEL GUAMUEZ	29	19
VILLAGARZÓN	24	17
LEGUIZAMO	16	16
ORITO	26	21
SAN MIGUEL	15	14
SIBUNDOY	10	20
PUERTO GUZMAN	11	4
PUERTO CAICEDO	11	4
SANTIAGO	8	10
COLON	5	4
SAN FRANCISCO	4	3
<b>PUTUMAYO</b>	<b>251</b>	<b>231</b>

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 40 de 2016 a 2019

DECREMENTO	
INCREMENTO	
ESTABLE	

### 1.3. Proporción de casos de intento de suicidio por residencia

Según la proporción de casos de intento de suicidio para el año 2020 hasta semana epidemiológica 40, el primer lugar lo ocupa el municipio de Puerto Asís con 22,6% de los casos, seguido de Mocoa con 19,6 % de los casos, Orito con 8,9% de los casos, Sibundoy con 8,5% de los casos, Valle del Guamuez con 8,1% de los casos, Villagarzón con 7,2% de los casos, Leguizamo con 6,8% de los casos, San Miguel con 6,0% de los casos, Santiago con 4,3% de los casos, Colón, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán con 1,7% de los casos cada uno y San Francisco con 1,3% de los casos.

**Tabla 2. Proporción de casos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 40, 2020**

Municipio de RESIDENCIA	Total	Proporción
PUERTO ASIS	53	22,6
MOCOA	46	19,6
ORITO	21	8,9


<b>SIBUNDOY</b>	20	8,5
<b>VALLE DEL GUAMUEZ</b>	19	8,1
<b>VILLAGARZON</b>	17	7,2
<b>LEGUIZAMO</b>	16	6,8
<b>SAN MIGUEL</b>	14	6,0
<b>SANTIAGO</b>	10	4,3
<b>COLON</b>	4	1,7
<b>PUERTO CAICEDO</b>	4	1,7
<b>PUERTO GUZMAN</b>	4	1,7
<b>SAN FRANCISCO</b>	3	1,3
<b>OTRO DEPTO</b>	4	1,7
<b>Total general</b>	235	100,0

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 40- 2020

#### 1.4. Incidencia de casos de intento de suicidio, para el año 2020.

La incidencia más alta de intento de suicidio en el año 2020 hasta semana epidemiológica 40, la presentó **Santiago** con 136,8 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, seguido de **Sibundoy** con 129,3 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Puerto Asís** con 78,9 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Mocoa** con 78,0% casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Colón** con 72,3% casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **San Miguel** con 72,0% casos nuevos por cada 100.000 habitantes y **Villagarzón** con 70,6% casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Los demás municipios presentan incidencias más bajas que la del departamento que es de 64,3 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. El municipio con menor incidencia es **Puerto Guzmán** con 10,9 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Colombia presenta una incidencia de 40,1 casos nuevos por 100.000 habitantes.

**Grafica 2. Incidencia de intento de suicidio, según municipio de procedencia, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-40, 2020**



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 40- 2020

### 1.5. Variables sociodemográficas del evento de intento de suicidio

Los casos notificados de intento de suicidio corresponden en mayor porcentaje al sexo femenino. Según el área de residencia la mayoría vive en la cabecera municipal, seguida de la zona rural dispersa y en tercer lugar en el centro poblado. De acuerdo con el tipo de régimen en primer lugar las personas estaban afiliadas al régimen subsidiado, seguido de no asegurado y régimen de excepción. Según la pertenencia étnica la mayoría pertenecen a otra etnia, seguidos de etnia indígena. Los grupos de edad se encuentran en su mayoría en el rango de 15 a 19 años, seguido del grupo de 20 a 24 años, 25 a 29 años y el grupo de edad de 10 a 14 años, los demás grupos con menor proporción de casos.

**Tabla 3. Variables sociodemográficas de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 40, 2020**

VARIABLE	CATEGORÍA	CASOS	%
SEXO	FEMENINO	137	58,3
	MASCULINO	98	41,7
ÁREA DE RESIDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	148	63,0
	CENTRO POBLADO	14	6,0
	RURAL DISPERSA	73	31,1

TIPO DE RÉGIMEN	SUBSIDIADO	191	81,3
	CONTRIBUTIVO	10	4,3
	NO ASEGURADO	18	7,7
	EXCEPCIÓN	15	6,4
	INDETERMINADO/PENDIENTE	1	0,4
PERTENENCIA ÉTNICA	OTROS	203	86,4
	INDÍGENA	27	11,5
	AFROCOLOMBIANO	4	1,7
	ROM GITANO	1	0,4
	RAIZAL	0	0,0
GRUPOS DE EDAD	PALENQUERO	0	0,0
	0-4	0	0,0
	5-9	2	0,9
	10-14	27	11,5
	15-19	77	32,8
	20-24	55	23,4
	25-29	28	11,9
	30-34	19	8,1
	35-39	4	1,7
	40-44	8	3,4
	45-49	5	2,1
	50-54	7	3,0
	55-59	1	0,4
	60-64	0	0,0
	65-69	2	0,9
	70-74	0	0,0
75-79	0	0,0	
80-84	0	0,0	
85-89	0	0,0	

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 40- 2020

#### 1.6. Distribución del número de intentos previos de intento de suicidio, Putumayo, año 2020

De los 235 casos notificados, el 33,2 (78 casos) de los casos si tuvieron intentos previos y el 66,8% (157 casos) no tuvieron intentos previos. Según la distribución del número de intentos previos, el primer lugar es una vez con 34 casos (43,6%), seguido de dos veces con 26 casos (33,3%).

Tabla4. Distribución del número de intentos previos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-40, 2020

Numero de Intentos	Total	%
1 vez	34	43,6
2 veces	26	33,3
3 veces	5	6,4


Más de 3 veces	8	10,3
Desconocido	5	6,4
<b>Total con intentos</b>	<b>78</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 40- 2020

### 1.7. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, año 2020

De los 235 casos notificados, el 72,3% (170 casos) de los casos tuvieron intentos de suicidio mediante el mecanismo de intoxicación, el 20,0 % (47 casos) tuvieron intentos de suicidio con arma corto-punzante, el 3,8 % (9 casos) tuvieron intentos de suicidio a través de ahorcamiento o asfixia, el 2,1 % (5 casos) tuvieron intentos de suicidio a través de lanzamiento al vacío, el 1,3 % (3 casos) tuvieron intentos de suicidio a través de arma de fuego y el 0,4 % (1 caso) tuvo intento de suicidio a través de lanzamiento a vehículo; los demás mecanismos no tuvieron casos. De los 170 casos de intentos de suicidio por intoxicación, la mayoría utilizó plaguicidas (98 casos), seguidos de medicamentos (60 casos).

Grafica3. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-40, 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 40- 2020

**Elaboró:** Alexandra Mora Carvajal  
Epidemióloga de apoyo

**Revisó y aprobó:** Andrea Morillo Gómez  
P. E. área de Epidemióloga SSD