

**Boletín mensual de Intento de suicidio,
Periodo 12,
Semana epidemiológica 1 a semana epidemiológica 48 (29 de
diciembre de 2019 al 28 de noviembre) año 2020**



Grafica

- Grafica 1.** Casos de *intento de suicidio*, año 2018,2019 y 2020, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-48
- Grafica 2.** Incidencia de intento de suicidio, según municipio de procedencia, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-48, 2020
- Grafica 3.** Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-48, 2020

Tabla

- Tabla 1.** Comportamiento inusual de *intento de suicidio*, Putumayo, 2016 a 2020, semanas epidemiológicas 1- 48
- Tabla 2.** Proporción de casos de intento de suicidio Putumayo, semanas epidemiológicas 1-48, 2020.
- Tabla 3.** Variables sociodemográficas de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-48, 2020
- Tabla 4.** Distribución de los tipos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-48, 2020



Tabla de contenido

1. *Intento de suicidio*.....04

1.1. *Tendencia intento de suicidio, 2017, 2018 y 2019, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-48*.....04

1.2. *Comportamiento inusual del evento de intento de suicidio, año 2016 a 2019 hasta semana epidemiológica 48* 04

1.3. *Proporción de casos de intento de suicidio por procedencia*.....05

1.4. *Incidencia de casos de intento de suicidio, para el año 2020*..... 06

1.5. *Variables sociodemográficas del evento de intento de suicidio*..... 06

1.6. *Distribución de los tipos de intento de suicidio, Putumayo, año 2020*..... 08


1.7. *Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-48, 2020*..... 08

1. Intento de suicidio

1.1. **Tendencia del evento de intento de suicidio, año 2018, 2019 y 2020 hasta semana epidemiológica 48.**

Para el año 2018 hasta la semana epidemiológica 48 se notificaron a Sivigila 306 casos, para el año 2019 se notificaron 370 casos y para el año 2020 se han notificado 288 casos, lo que nos indica que se disminuyó la cantidad de casos que se han notificado en el año 2020 comparado con los años anteriores, es importante resaltar que para el último año la mayor presencia de casos se dio en la semana epidemiológica 27 y la tendencia durante este año es a mantener el número de los casos. Se observó una disminución del 22,2% de los casos en el año 2020 comparado con el año 2019. Se notifican en promedio cada semana 6 casos.

Grafica 1. Casos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 48, 2018, 2019 y 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 44 de 2018 a 2020

1.2. **Comportamiento inusual del evento de intento de suicidio, año 2016 a 2020 hasta semana epidemiológica 48.**

Para el año 2020 hasta la semana epidemiológica 48, los municipios de Puerto Asís y Sibundoy presentaron incremento del número de casos. Los municipios de Valle del Guamuez, Villagarzón, Orito, Puerto Guzmán y el departamento de Putumayo presentaron decremento de los casos. Los demás municipios se mantuvieron estables.

Tabla 1. Comportamiento inusual de intento de suicidio, Putumayo, 2016 a 2020, semanas epidemiológicas 1- 48

MUNICIPIOS	PROMEDIO HISTORICO 2016-2019	OBSERVADO 2020
MOCOA	58	53
PUERTO ASIS	55	69
VALLE DEL GUAMUEZ	34	25
VILLAGARZÓN	31	22
LEGUIZAMO	21	18
ORITO	32	23
SAN MIGUEL	19	16
SIBUNDOY	13	21
PUERTO GUZMAN	14	7
PUERTO CAICEDO	13	8
SANTIAGO	9	12
COLON	7	6
SAN FRANCISCO	4	3
PUTUMAYO	307	283

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 48 de 2016 a 2020

DECREMENTO	
INCREMENTO	
ESTABLE	

1.3. Proporción de casos de intento de suicidio por residencia

Según la proporción de casos de intento de suicidio para el año 2020 hasta semana epidemiológica 48, el primer lugar lo ocupa el municipio de Puerto Asís con 24,0% de los casos, seguido de Mocoa con 18,4 % de los casos, Valle del Guamuez con 8,7% de los casos, Orito con 8,0% de los casos, Villagarzón con 7,6% de los casos, Sibundoy con 7,3% de los casos, Leguízamo con 6,3% de los casos, San Miguel con 5,6% de los casos, Santiago con 4,2% de los casos, Puerto Caicedo con 2,8% de los casos, Puerto Guzmán con 2,4% de los casos, Colón con 2,1% de los casos y San Francisco con 1,0% de los casos.

Tabla 2. Proporción de casos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 48, 2020

Municipio de RESIDENCIA	Total	Proporción
PUERTO ASIS	69	24,0
MOCOA	53	18,4
VALLE DEL GUAMUEZ	25	8,7
ORITO	23	8,0


VILLAGARZON	22	7,6
SIBUNDOY	21	7,3
LEGUIZAMO	18	6,3
SAN MIGUEL	16	5,6
SANTIAGO	12	4,2
PUERTO CAICEDO	8	2,8
PUERTO GUZMAN	7	2,4
COLON	6	2,1
SAN FRANCISCO	3	1,0
OTRO DEPTO	5	1,7
Total general	288	100,0

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 48- 2020

1.4. Incidencia de casos de intento de suicidio, para el año 2020.

La incidencia más alta de intento de suicidio en el año 2020 hasta semana epidemiológica 48, la presentó **Santiago** con 164,2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, seguido de **Sibundoy** con 135,7 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Colón** con 108,5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Puerto Asís** con 102,7% casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Villagarzón** con 91,3% casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Mocoa** con 89,9% casos nuevos por cada 100.000 habitantes y **San Miguel** con 82,3% casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Los demás municipios presentan incidencias más bajas que la del departamento que es de **78,8** casos nuevos por cada 100.000 habitantes. El municipio con menor incidencia es **Puerto Guzmán** con 19,1 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Colombia presenta una incidencia de **45,7** casos nuevos por 100.000 habitantes.

Grafica 2. Incidencia de intento de suicidio, según municipio de procedencia, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-48, 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 48- 2020

1.5. Variables sociodemográficas del evento de intento de suicidio

Los casos notificados de intento de suicidio corresponden en mayor porcentaje al sexo femenino. Según el área de residencia la mayoría vive en la cabecera municipal, seguida de la zona rural dispersa y en tercer lugar en el centro poblado. De acuerdo con el tipo de régimen en primer lugar las personas estaban afiliadas al régimen subsidiado, seguido de no asegurado, régimen contributivo y régimen de excepción. Según la pertenencia étnica la mayoría pertenecen a otra etnia, seguidos de etnia indígena. Los grupos de edad se encuentran en su mayoría en el rango de 15 a 19 años, seguido del grupo de 20 a 24 años, 10 a 14 años y el grupo de edad de 25 a 29 años, los demás grupos con menor proporción de casos.

Tabla 3. Variables sociodemográficas de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 48, 2020

VARIABLE	CATEGORÍA	CASOS	%
SEXO	FEMENINO	168	58,3
	MASCULINO	120	41,7
ÁREA DE RESIDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	176	61,1
	CENTRO POBLADO	19	6,6
	RURAL DISPERSA	93	32,3
TIPO DE RÉGIMEN	SUBSIDIADO	233	80,9
	CONTRIBUTIVO	18	6,3

PERTENENCIA ÉTNICA	NO ASEGURADO	19	6,6
	EXCEPCIÓN	17	5,9
	INDETERMINADO/PENDIENTE	1	0,3
	OTROS	249	86,5
	INDÍGENA	33	11,5
	AFROCOLOMBIANO	5	1,7
	ROM GITANO	1	0,3
	RAIZAL	0	0,0
GRUPOS DE EDAD	PALENQUERO	0	0,0
	0-4	0	0,0
	5-9	3	1,0
	10-14	36	12,5
	15-19	96	33,3
	20-24	64	22,2
	25-29	31	10,8
	30-34	23	8,0
	35-39	6	2,1
	40-44	11	3,8
	45-49	7	2,4
	50-54	8	2,8
	55-59	1	0,3
	60-64	0	0,0
	65-69	2	0,7
	70-74	0	0,0
	75-79	0	0,0
	80-84	0	0,0
85-89	0	0,0	

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 48- 2020

1.6. Distribución del número de intentos previos de intento de suicidio, Putumayo, año 2020

De los 288 casos notificados, el 31,3 (90 casos) de los casos si tuvieron intentos previos y el 68,8% (198 casos) no tuvieron intentos previos. Según la distribución del número de intentos previos, el primer lugar es una vez con 41 casos (45,6%), seguido de dos veces con 27 casos (30,0%).

Tabla4. Distribución del número de intentos previos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-48, 2020


Numero de Intentos	Total	%
1 vez	41	45,6
2 veces	27	30,0
3 veces	7	7,8
Más de 3 veces	10	11,1
Desconocido	5	5,6
Total con intentos	90	100,0

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 48- 2020

1.7. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, año 2020

De los 288 casos notificados, el 72,6% (209 casos) de los casos tuvieron intentos de suicidio mediante el mecanismo de intoxicación, el 19,8% (57 casos) tuvieron intentos de suicidio con arma corto-punzante, el 3,1% (9 casos) tuvieron intentos de suicidio a través de ahorcamiento o asfixia, el 2,1% (6 casos) tuvieron intentos de suicidio a través de lanzamiento al vacío, el 1,2% (4 casos) tuvieron intentos de suicidio a través de arma de fuego y el 1,4% (3 casos) tuvo intento de suicidio a través de lanzamiento a vehículo; los demás mecanismos no tuvieron casos. De los 188 casos de intentos de suicidio por intoxicación, la mayoría utilizó plaguicidas (108 casos), seguidos de medicamentos (65 casos).

Grafica3. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-48, 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 48- 2020

Elaboró: Alexandra Mora Carvajal
Epidemióloga de apoyo

Revisó y aprobó: Andrea Morillo Gómez
P. E. área de Epidemióloga SSD