

**Boletín mensual de Intento de suicidio,  
Periodo 13,  
Semana epidemiológica 1 a semana epidemiológica 53, año 2020  
(29 de diciembre de 2019 al 2 de enero de 2021)**



## Grafica

**Grafica 1.** Casos de *intento de suicidio*, año 2018,2019 y 2020, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-53

**Grafica 2.** Incidencia de intento de suicidio, según municipio de procedencia, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-53, 2020

**Grafica 3.** Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-53, 2020

## Tabla

**Tabla 1.** Comportamiento inusual de *intento de suicidio*, Putumayo, 2016 a 2020, semanas epidemiológicas 1- 53

**Tabla 2.** Proporción de casos de intento de suicidio Putumayo, semanas epidemiológicas 1-53, 2020.

**Tabla 3.** Variables sociodemográficas de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-53, 2020

**Tabla 4.** Distribución de los tipos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-53, 2020



### Tabla de contenido


1. Intento de suicidio.....	04
1.1. Tendencia intento de suicidio, 2017, 2018 y 2019, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-53.....	04
1.2. Comportamiento inusual del evento de intento de suicidio, año 2016 a 2019 hasta semana epidemiológica 53 .....	04
1.3. Proporción de casos de intento de suicidio por procedencia.....	05
1.4. Incidencia de casos de intento de suicidio, para el año 2020.....	06
1.5. Variables sociodemográficas del evento de intento de suicidio.....	06
1.6. Distribución de los tipos de intento de suicidio, Putumayo, año 2020.....	08
1.7. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-53, 2020.....	08

## 1. Intento de suicidio

### 1.1. **Tendencia del evento de intento de suicidio, año 2018, 2019 y 2020 hasta semana epidemiológica 53.**

Para el año 2018 hasta la semana epidemiológica 53 se notificaron a Sivigila 334 casos, para el año 2019 se notificaron 403 casos y para el año 2020 se han notificado 324 casos, lo que nos indica que se disminuyó la cantidad de casos que se han notificado en el año 2020 comparado con los años anteriores, es importante resaltar que para el último año la mayor presencia de casos se dio en la semana epidemiológica 52, seguida de la semana 27 y la tendencia durante este año es al aumento significativo del número de los casos. Se observó una disminución del 19,6% de los casos en el año 2020 comparado con el año 2019. Se notifican en promedio cada semana 6 casos.

**Grafica 1. Casos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 53, 2018, 2019 y 2020**



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 53 de 2018 a 2020

### 1.2. **Comportamiento inusual del evento de intento de suicidio, año 2016 a 2020 hasta semana epidemiológica 53.**

Para el año 2020 hasta la semana epidemiológica 53, los municipios de Puerto Asís y Sibundoy presentaron incremento del número de casos. Los municipios de Valle del Guamuez, Villagarzón, Orito, Puerto Guzmán y el departamento de Putumayo presentaron decremento de los casos. Los demás municipios se mantuvieron estables.

**Tabla 1. Comportamiento inusual de intento de suicidio, Putumayo, 2016 a 2020, semanas epidemiológicas 1- 53**

MUNICIPIOS	PROMEDIO HISTORICO 2016-2019	OBSERVADO 2020
MOCOA	64	65
PUERTO ASIS	62	73
VALLE DEL GUAMUEZ	35	29
VILLAGARZÓN	33	22
LEGUIZAMO	21	19
ORITO	33	27
SAN MIGUEL	20	21
SIBUNDOY	16	22
PUERTO GUZMAN	13	10
PUERTO CAICEDO	13	8
SANTIAGO	10	14
COLON	7	7
SAN FRANCISCO	4	3
<b>PUTUMAYO</b>	<b>335</b>	<b>320</b>

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 53 de 2016 a 2020

DECREMENTO	
INCREMENTO	
ESTABLE	

### 1.3. Proporción de casos de intento de suicidio por residencia

Según la proporción de casos de intento de suicidio para el año 2020 hasta semana epidemiológica 53, el primer lugar lo ocupa el municipio de Puerto Asís con 22,5% de los casos, seguido de Mocoa con 20,1 % de los casos, Valle del Guamuez con 9,0% de los casos, Orito con 8,3% de los casos, Villagarzón y Sibundoy con 6,8% de los casos, San Miguel con 6,5% de los casos, Leguízamo con 5,9% de los casos, Santiago con 4,3% de los casos, Puerto Guzmán con 3,1% de los casos, Puerto Caicedo con 2,5% de los casos, Colón con 2,2% de los casos y San Francisco con 0,9% de los casos.

**Tabla 2. Proporción de casos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 53, 2020**

Municipio de RESIDENCIA	Total	Proporción
PUERTO ASIS	73	22,5
MOCOA	65	20,1
VALLE DEL GUAMUEZ	29	9,0
ORITO	27	8,3


<b>SIBUNDOY</b>	22	6,8
<b>VILLAGARZON</b>	22	6,8
<b>SAN MIGUEL</b>	21	6,5
<b>LEGUIZAMO</b>	19	5,9
<b>SANTIAGO</b>	14	4,3
<b>PUERTO GUZMAN</b>	10	3,1
<b>PUERTO CAICEDO</b>	8	2,5
<b>COLON</b>	7	2,2
<b>SAN FRANCISCO</b>	3	0,9
<b>OTRO DEPTO</b>	4	1,2
<b>TOTAL</b>	324	100,0

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 53- 2020

#### 1.4. Incidencia de casos de intento de suicidio, para el año 2020.

La incidencia más alta de intento de suicidio en el año 2020 hasta semana epidemiológica 53, la presentó **Santiago** con 191,6 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, seguido de **Sibundoy** con 142,2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Colón** con 126,6 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Mocoa** con 110,3% casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Puerto Asís** con 108,6% casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **San Miguel** con 108,1% casos nuevos por cada 100.000 habitantes y **Villagarzón** con 91,3% casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Los demás municipios presentan incidencias más bajas que la del departamento que es de **89,1** casos nuevos por cada 100.000 habitantes. El municipio con menor incidencia es **Puerto Guzmán** con 27,3 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Colombia presenta una incidencia de **49,6** casos nuevos por 100.000 habitantes.

**Grafica 2. Incidencia de intento de suicidio, según municipio de procedencia, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-53, 2020**



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 53- 2020

### 1.5. Variables sociodemográficas del evento de intento de suicidio

Los casos notificados de intento de suicidio corresponden en mayor porcentaje al sexo femenino. Según el área de residencia la mayoría vive en la cabecera municipal, seguida de la zona rural dispersa y en tercer lugar en el centro poblado. De acuerdo con el tipo de régimen en primer lugar las personas estaban afiliadas al régimen subsidiado, seguido de no asegurado, régimen contributivo y régimen de excepción. Según la pertenencia étnica la mayoría pertenecen a otra etnia, seguidos de etnia indígena. Los grupos de edad se encuentran en su mayoría en el rango de 15 a 19 años, seguido del grupo de 20 a 24 años, 25 a 29 años, 10 a 14 años y el grupo de edad de 30 a 34 años, los demás grupos con menor proporción de casos.

**Tabla 3. Variables sociodemográficas de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 53, 2020**

VARIABLE	CATEGORÍA	CASOS	%
SEXO	FEMENINO	187	57,7
	MASCULINO	137	42,3
ÁREA DE RESIDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	197	60,8
	CENTRO POBLADO	20	6,2
	RURAL DISPERSA	107	33,0
TIPO DE RÉGIMEN	SUBSIDIADO	266	82,1
	CONTRIBUTIVO	19	5,9
	NO ASEGURADO	21	6,5

PERTENENCIA ÉTNICA	EXCEPCIÓN	17	5,2
	INDETERMINADO/PENDIENTE	1	0,3
	OTROS	281	86,7
	INDÍGENA	35	10,8
	AFROCOLOMBIANO	7	2,2
	ROM GITANO	1	0,3
	RAIZAL	0	0,0
	PALENQUERO	0	0,0
GRUPOS DE EDAD	0-4	0	0,0
	5-9	3	0,9
	10-14	37	11,4
	15-19	107	33,0
	20-24	73	22,5
	25-29	38	11,7
	30-34	24	7,4
	35-39	7	2,2
	40-44	14	4,3
	45-49	8	2,5
	50-54	8	2,5
	55-59	2	0,6
	60-64	0	0,0
	65-69	3	0,9
	70-74	0	0,0
	75-79	0	0,0
	80-84	0	0,0
85-89	0	0,0	

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 53- 2020

#### 1.6. Distribución del número de intentos previos de intento de suicidio, Putumayo, año 2020

De los 324 casos notificados, el 30,6 (99 casos) de los casos si tuvieron intentos previos y el 69,4% (225 casos) no tuvieron intentos previos. Según la distribución del número de intentos previos, el primer lugar es una vez con 43 casos (43,4%), seguido de dos veces con 31 casos (31,3%).

Tabla4. Distribución del número de intentos previos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-53, 2020


Numero de Intentos	Total	%
1 vez	43	43,4
2 veces	31	31,3
3 veces	8	8,1
Más de 3 veces	12	12,1
Desconocido	5	5,1
<b>Total con intentos</b>	<b>99</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 53- 2020

**1.7. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, año 2020**

De los 324 casos notificados, el 73,8% (239 casos) de los casos tuvieron intentos de suicidio mediante el mecanismo de intoxicación, el 19,1 % (62 casos) tuvieron intentos de suicidio con arma corto-punzante, el 3,1 % (10 casos) tuvieron intentos de suicidio a través de ahorcamiento o asfixia, el 1,9 % (6 casos) tuvieron intentos de suicidio a través de lanzamiento al vacío, el 1,2 % (4 casos) tuvieron intentos de suicidio a través de arma de fuego, el 0,9 % (3 casos) tuvo intento de suicidio a través de lanzamiento a vehículo y el 0,3 % (1 caso) tuvo intento de suicidio a través de lanzamiento al agua; los demás mecanismos no tuvieron casos. De los 239 casos de intentos de suicidio por intoxicación, la mayoría utilizó plaguicidas (142 casos), seguidos de medicamentos (79 casos).

**Grafica3. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-53, 2020**



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 53- 2020

**Elaboró:** Alexandra Mora Carvajal  
Epidemióloga de apoyo

**Revisó y aprobó:** Andrea Morillo Gómez  
P. E. área de Epidemióloga SSD