



Gerardo Chasoy

BOLETIN N° 13.
CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL.

SEMANA -16

Violencias- Conducta Suicida- Trastornos mentales- Consumo Alcohol/SPA





La salud mental necesita una gran cantidad de atención. Es un gran tabú final y tiene que ser encarado y resuelto.-Adam Ant



OBSERVATORIO

De salud mental Putumayo

observatorio.smputumayo@hotmail.com

Corte semana epidemiología 16, 2017 (1 de Enero a 22 de Abril)

Elaboró: Epidemióloga-Adriana Quistial Enríquez. Profesional Esp. Apoyo Observatorio Salud mental

Revisó: Sandra L. Chamorro M. Profesional U. Coordinadora Prioridades en Salud Pública





TABLA DE CONTENIDO

1. CONDUCTA SUICIDA, PUTUMAYO 2017	5
1.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE NOTIFICACIÓN	5
1.2 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA	6
1.3 COMPORTAMIENTO DE CONDUCTA SUICIDA SEGUN SEXO E INTENTOS PREVIOS	7
1.4 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA – SEXO	8
1.5 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SEGÚN FACTORES DESCENDENANTES – SEXO	8
1.6 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LOS CASOS PRESENTADOS CON INTENTOS SUICIDA.	9
1.7 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANISMO CAUSAL.	10
2. TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	10
2.1 CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	10
3. COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2017	13
3.1 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA	13
3.2 COMPORTAMIENTO SOCIO DEMOGRAFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO PUTUMAYO 2017.	15
3.3 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN SEXO – RANGO DE EDAD	15
3.4 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN SEMANA EPIDEMIOLOGICA. SEMANA-16-2017	15
3.5 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA. SEMANA 10-2017	16
3.6 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA SEGÚN SEXO	17
3.7 RELACIÓN VICTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA	17
3.8 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR	18
3.9 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO. CORTE SEMANA 16 -2017	19
CONCLUSIONES	20





LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1. Distribución de tasas de incidencia casos de conducta suicida según municipio de notificación. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017. .	6
Gráfica 2. Distribución de casos de conducta suicida según partencia étnica. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017.	8
Gráfica 3. Distribución de casos de conducta suicida según Factores desencadenantes. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017.	9
Gráfica 4. Distribución de los factores de riesgo con intento suicida. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017.	9
Gráfica 5. Gráfico 5. Distribución de los casos de conducta suicida según mecanismo causal y sexo. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017	10
Gráfica 6. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo y rango de edad. Corte Enero. Departamento del Putumayo 2017	11
Gráfica 7. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo .Corte Marzo. Departamento del Putumayo 2017.....	12
Gráfica 8. Trastornos mentales asociados a consumo de SPA según zona rural y sexo. Departamento del Putumayo 2017.....	13
Gráfica 9. Distribución de tasas de incidencia casos Violencia según municipio de residencia. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017.....	14
Gráfica 10. Violencia de género en el departamento del Putumayo según sexo- rango de edad, Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017.....	15
Gráfica 11. Comportamiento epidemiológico de tipos de violencia según semana epidemiológica. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017..	16
Gráfica 12. Distribución de casos de violencia de genero según pertenencia étnica –sexo. Corte semana 16 Departamento del Putumayo 2017.....	16
Gráfica 13. Distribución de casos de las formas de violencia según sexo reportadas al SIVIGILA. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017.....	17
Gráfica 14. Relación victima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017.....	18
Gráfica 15. Relación victima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017.....	18
Gráfica 16. Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017.....	19





LISTA DE MAPAS

Mapa 1. Intento de suicidio según municipio de notificación. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017..... 5

Mapa 2. Trastorno mental y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Corte Marzo - 2017 Departamento del Putumayo 2017..... 11

Mapa 3. Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017..... 13

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017..... 7

Tabla 2. Distribución de intentos de suicidio según sexo. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017..... 7






1. CONDUCTA SUICIDA, PUTUMAYO 2017

1.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE NOTIFICACIÓN

En el presente año según información recopilada de fuentes como: SIVIGILA y Observatorio de Salud Mental (con corte semana epidemiológica 1 a la 16 DEL AÑO 2017) con registro de las 10 IPS del departamento las cuales son : E.S.E HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL, E.S.E HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ, E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS, E.S.E HOSPITAL FRONTERIZO LA DORADA, E.S.E HOSPITAL PIO XII, ESE HOSPITAL ORITO, E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, E.S.E HOSPITAL MARIA ANGELINES, ESE HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ, de los cuales se obtuvo lo siguiente: 98 Casos con conducta suicida, y al analizar estos casos por Municipio de Notificación, Puerto Asís con 16 casos, Mocoa, Valle de Guamuéz y Villagarzón con 14 casos cada municipio, Colon 9 casos, Puerto Caicedo con 8 casos, Orito 7 casos, , San Miguel (la Dorada) con 6 casos, Puerto Leguizamo 4 casos, Puerto Guzmán 3 casos , Putumayo Municipio desconocido 1 caso, Otros departamentos 2 casos. Ver mapa 1.

Mapa 1. Intento de suicidio según municipio de notificación. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 16 . Año 2017.

Al evaluar la tasa de incidencia según municipio de notificación estos eventos en el departamento del Putumayo se encontró:


Que en el municipio de Puerto Asís se están presentado 2.6 casos de intentos suicidas por 10.000 habitantes, seguido de Puerto Caicedo con 4.2 casos de intentos suicidas por 10.000 habitantes, Mocoa con 3.43 casos de intentos suicidas por 10.000 habitantes, Valle del Guamuéz con 9.78 casos de intentos suicidas por 10.000 habitantes, Villagarzón 9.54 casos





de intentos suicidas por 10.000 habitantes, Orito con 5.20 casos de intentos suicidas, Puerto Caicedo con 3.33 casos de intentos suicidas por 10.000 habitantes, San Miguel con 1.09 casos de intentos suicidas por 10.000 habitantes, Puerto Leguizamo 1.44 casos de intentos suicidas por 10.000 habitantes, Puerto Guzmán con 1.44 casos de intentos suicidas por 10.000 habitantes, Putumayo con 2.77 casos de intento suicido por 10.000 habitantes ; en el caso de Colon al ser un municipio con población menor a 10.000 habitantes, la incidencia se realiza con base 1.000 habitantes para no realizar un indicador erróneo puesto que aumentaría la tasa de incidencia al tomarlo con base de mayor población, en el cual se presentan 1.61 casos de intento suicida por 1.000 habitantes, como lo muestra la gráfica Numero 1.

Gráfica 1. Distribución de tasas de incidencia casos de conducta suicida según municipio de notificación. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 16 Año 2017.

1.2 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA

Para corte semana 16, se sigue evidenciado un aumento paulatino de los casos de conducta suicida, evidenciándose el mismo histórico donde las mujeres presentan más casos de intentos suicida que los hombres; evidenciándose lo siguiente: 57 (57%) casos en mujeres, y 42 (42%) casos en hombres.

Con respecto al grupo de edad, y según sexo, el grupo etario donde más casos se presentaron fueron 15-19 años de edad y 20-24 tanto para hombres como para mujeres ; al evaluar el rango de edad de las mujeres, se encontró: que de 10-14 años de edad con un 8.16 % (n=8) , 15-16 años de edad con un 38.78% (n=38), seguido de 20 -24 años de edad con un 22% (n= 21), 25-29 años de edad con 14.29% (n=14), de 30-34 años de edad con 5.10% (n= 5), de 35-39 años de edad con 4% (n=4), 40-44 años de edad con 4%(n=4), 45-49 años de edad con 2%(n=2), 50-54 años de edad con 2% (n=2), Tabla número 1.





Tabla 1. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017.

Rango de Edad	Mujeres	Porcentaje	Hombres	Porcentaje	Total general	Porcentaje
10-14	7	12,5	1	2,38	8	8,16
15-19	22	39,3	16	38,10	38	38,78
20-24	13	23,2	8	19,05	21	21,43
25-29	7	12,5	7	16,67	14	14,29
30-34	3	5,4	2	4,76	5	5,10
35-39	3	5,4	1	2,38	4	4,08
40-44	1	1,8	3	7,14	4	4,08
45-49		0,0	2	4,76	2	2,04
50-54		0,0	2	4,76	2	2,04
Total general	56	100	42	100	98	100

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 16. Año 2017.

1.3 COMPORTAMIENTO DE CONDUCTA SUICIDA SEGUN SEXO E INTENTOS PREVIOS

De los 98 casos con intencionalidad suicida reportados, el 71 % (n= 70) no presentaron intentos previos, 10% (n=10), presentaron un intento previo, 8.2% (n= 8) presentaron 2 intentos previos, 3.1% (n=3), presentaron 3 intentos previos, el 7.1 % (n=7) con 4 intentos previos, y 3% (n= 3) sin dato, tabla 2.

Tabla 2. Distribución de intentos de suicidio según sexo. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017.

Intentos	Mujeres	Hombres	Total general	Porcentaje
sin intentos previos	40	30	70	71,4
1	5	5	10	10,2
2	5	3	8	8,2
3	3	0	3	3,1
4	3	4	7	7,1
Sin Dato	1	2	3	3,1
Total general	56	42	98	100

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 16. Año 2017.






1.4 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA – SEXO

La conducta suicida en relación con la pertenencia étnica, Se encontraron 10 indígenas, de las cuales son 4 mujeres y 6 hombres, 3 Afrocolombianos, 1 mujer y 2 hombres, otro 85 casos de los cuales 51 mujeres y 34 hombres. Ver Gráfico 2.

Gráfica 2. Distribución de casos de conducta suicida según pertenencia étnica. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 16. Año 2017.

1.5 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SEGÚN FACTORES DESCENCADENANTES – SEXO

En cuanto a los factores desencadenantes de los intentos suicidas del departamento del Putumayo notificados a SIVIGILA, se encontró lo siguiente:

Conflictos de pareja fue el factor que mayores casos desencadenó el haber realizado intento suicida con un 57% (mujeres y hombres n= 28 cada uno), seguido de problemas económicos con 11% (mujeres n= 6, hombres n=5), Otros 11% (mujeres n=11), maltrato físico 6.1% (mujeres n= 6), los demás problemáticas de base se encuentran relacionadas en la gráfica 3





Gráfica 3. Distribución de casos de conducta suicida según Factores desencadenantes. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 16. Año 2017.

1.6 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LOS CASOS PRESENTADOS CON INTENTOS SUICIDA.

En relación con los factores de riesgo presentados en los casos con intentos suicidas se presentó:

Que el 22.4 % de los intentos suicidas presentaron ideación suicida, el 19.4 % presentaron depresión, 13.3 % presentaron trastorno mental, 8.2% presentaron consumo de SPA, antecedentes familiares de suicidio 4.1%, antecedentes de violencia sexual con 3.1%, trastorno bipolar 2%, esquizofrenia 1%. Ver gráfico 4

Gráfica 4. Distribución de los factores de riesgo con intento suicida. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 16. Año 2017.






1.7 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANICANISMO CAUSAL.

Al realizar el análisis entre mecanismo causal y sexo a semana 10 de 2017 se evidencia que el método más utilizado para auto daño es la intoxicación representando el 70 % (n= 44) más que los otros mecanismos, seguido de arma corto punzante 14.5% (n=9), ahorcamiento con 8% (n=5), en relación a mujeres y hombres se evidenció que las mujeres (56.454%) presentan más prevalencia con conducta suicida que los hombres (43.54%), con una diferencia de 12.9 puntos porcentuales por encima de los casos de los hombres. Grafica 5

Gráfica 5. Gráfico 5. Distribución de los casos de conducta suicida según mecanismo causal y sexo. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 16. Año 2017.

2. TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

2.1 CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.


Los trastorno mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas se encontraron 30 casos, según RIPS (corte Marzo) en el departamento del Putumayo; evidenciándose que los hombres presentan un 80% (24 casos) de trastornos mentales y de





comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas y en las mujeres un 20% (6 casos). Mapa 2.

Mapa 2. Trastorno mental y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Corte Marzo - 2017 Departamento del Putumayo 2017




Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte Marzo Año 2017.

En cuanto al rango de edad, se encontraron con afectación rangos de edad desde 10 a 14 años de edad en adelante;

De 10-14 años con 4 casos, de los cuales 2 casos son hombres y 2 casos mujeres, de 15-19 años de edad con 15 casos, de los cuales 2 casos son mujeres y 9 casos hombres, de 20-24 años con 5 casos, de 20-24 años de edad con 5 casos en hombres, de 25-29 años de edad con 6 casos, 2 mujeres y 4 hombres, 30-34 años de edad con 3 casos en hombres, 35-39 años con 1 caso. Grafico 6

Gráfica 6. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo y rango de edad. Corte Enero. Departamento del Putumayo 2017



Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte Marzo, Año 2017.






Al realizar una revisión de los diagnósticos del CIE10, se encontraron trastornos mentales y de comportamiento asociados al uso de: alucinógenos, cannabinoides, cocaína, múltiples; cuyas sustancias ocasionaron afecciones en las personas tipo: trastornos mentales y del comportamiento, intoxicación aguda, síndrome de dependencia, uso nocivo, estado de abstinencia, síndrome de dependencia, trastorno psicótico.

Al analizar a detalle se encontró que las sustancias psicoactivas causantes de más casos de **intoxicación aguda** fue con alucinógeno con 6.7% (2 Hombres), en cuanto al **estado de abstinencia** se encontraron que el uso de cocaína, presentaron una frecuencia de 6.7%, a lo que equivalieron a 2 casos en hombres y mujeres; al referirse al **síndrome de dependencia** como trastorno mental y de comportamiento estuvieron: cocaína con 13% (1 mujeres- 3 hombres), seguido de cannabinoides con 10% (2 mujeres- 1 hombre), uso nocivo con 20%, causado por cannabinoides en casos de 1 mujer y 5 hombres, con 10% el uso de alcohol refiriéndose a 3 hombres.

Los demás trastornos mentales causados por uso de sustancias psicoactivas se encuentra en la gráfica 7.

Gráfica 7. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo. Corte Marzo. Departamento del Putumayo 2017.




Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental), Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. corte Marzo Año 2017.

En el caso de la zona rural o urbana, se encontró que la zona rural presentaron más casos con 17 casos de los cuales mujeres fueron 3 casos y hombres 10 casos, en cuanto a la zona urbana se encontraron casos de los cuales fueron 7 hombres como lo muestra la gráfica 8.





Gráfica 8. Trastornos mentales asociados a consumo de SPA según zona rural y sexo. Departamento del Putumayo 2017




Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. corte Marzo, Año 2017.

3. COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2017

3.1 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA

Al realizar el análisis de casos de violencia reportados al SIVIGILA semana 16 año 2017, se encuentran 186 casos; de los cuales 10 casos son de residencia del Huila, Amazonas, Caldas Nariño, y Cauca, los eventos con residencia en el departamento se evidenciaron de la siguiente manera: Mocoa 39 casos, Puerto Asís 46 casos, Valle del Guamuéz 21 casos, Puerto Leguizamo 15 casos, Puerto Guzmán 11 casos, Orito 8 casos, San Miguel la Dorada 7 casos, San Francisco 4 casos, Colon 4 casos, Santiago 5 casos, Villagarzón 6 casos, Puerto Caicedo 6 casos, 1 caso correspondiente a Putumayo municipio Desconocido. Ver Mapa 3.

Mapa 3. Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 16 Año 2017






Al evaluar la tasa de incidencia según municipio de notificación de estos eventos en el departamento del Putumayo se encontró:

Que en el municipio de Mocoa se presentaron 10.06 casos por 10.000 habitantes, Puerto Leguizamo con 9.74 casos por 10.000 habitantes, Puerto Asís con 7.16 casos por 10.000 habitantes, tasas de incidencia que se encuentran por encima de la tasa a nivel departamental la cual se encuentra 5.25 casos por 10.000 habitantes, por debajo de esta tasa de incidencia se encuentran Valle del Guamuéz 3.96 casos por 10.000 habitantes, Puerto Guzmán con 4.58 por 10.000 habitantes, Colon con 2.86 por 10.000 habitantes, Puerto Caicedo con 2.73 por 10.000 habitantes, Villagarzón con 2.35 por 10.000 habitantes, San Miguel la dorada con 1.80 casos por 10.000 habitantes, Orito con 1.27 casos por 10.000 habitantes, Santiago con 0.94 casos por 10.000 habitantes.

En cuanto a Colon y San Francisco como son municipios que no superan los 10.000 habitantes, su tasa de incidencia se presenta por 1.000 habitantes para no inferir y no supra estimar el resultado, la cual corresponde a colon con 2.86 casos por 1.000 habitantes; gráfica 9.

Gráfica 9. Distribución de tasas de incidencia casos Violencia según municipio de residencia. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 16. Año 2017.






3.2 COMPORTAMIENTO SOCIO DEMOGRAFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO PUTUMAYO 2017.

3.3 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN SEXO – RANGO DE EDAD

De los 186 casos notificados al SIVIGILA en el departamento del Putumayo el 80% (n=149) fueron Mujeres y el 20% (n=37) fueron Hombres, evidenciándose claramente el maltrato hacia la Mujer putumayense; en cuanto al rango de edad, se evidencia diferencia tanto en hombres como en mujeres en la presencia de mayor número de casos, en la cual se presenta lo siguiente: Hombres: los tres grupos etéreos con mayor número de casos se encuentran de 0-4 años con 13 casos, de 5-9 años con 9 casos, de 10-14 años y de 80-84 años con 4 casos para cada uno. Mujeres: los tres grupos etéreos con mayor número de casos se encuentran de 10-14 años de edad con 45 casos, 15-19 años de edad con 23 casos, y de 0-4 años de edad con 15 casos; los demás rangos se evidencian en la Grafica 10.

Gráfica 10. Violencia de género en el departamento del Putumayo según sexo- rango de edad, Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 16. Año 2017

3.4 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN SEMANA EPIDEMIOLOGICA. SEMANA-16-2017

En el año 2017, con corte semana 16, de los 186 casos notificados por Violencia de Genero correspondientes al departamento del Putumayo, se Puede evidenciar picos más altos en las semanas 1, 3, 8, 12 y 13; en comparación al 2016 se presentaron picos más altos en las semanas epidemiológicas 2, 5 y 7, al realizar la comparación entre el total de casos entre la semana 16 del año 2016 y 2017, se presentan 24 casos más en el año inmediatamente anterior a corte semana 16 del año 2017. Ver gráfico 11.





Gráfica 11. Comportamiento epidemiológico de tipos de violencia según semana epidemiológica. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 16. Año 2017.

3.5 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN PERTENENCIA ETNICA. SEMANA 10-2017

En cuanto a la pertenencia étnica podemos encontrar, que el 16 % son indígenas (24 Mujeres – 6 Hombres), 2.6 % son Afrocolombiano (5 Mujeres), 81 % otros (120 Mujeres-31 Hombres). Ver Gráfico 12.

Gráfica 12. Distribución de casos de violencia de genero según pertenencia étnica –sexo. Corte semana 16 Departamento del Putumayo 2017



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 16. Año 2017.






3.6 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA SEGÚN SEXO

En relación al tipo de Violencia se encontró que la violencia física tiene mayor reporte de casos, tanto en hombres como en mujeres con un 34% (n=65) de los cuales 60 casos fueron mujeres y 5 casos en hombres, seguido de abuso sexual con un 32% (n=61) de los cuales fueron 56 casos mujeres y 5 casos hombres, negligencia y abandono con 22% (n=41) de los cuales 14 casos fueron mujeres y 27 casos en hombres, Violación con 8 % (n=15) de los cuales 15 casos fueron mujeres y 0 casos en hombres, Violencia Psicológica con un 1 % (n=2) de los cuales fueron 2 casos mujeres y 0 casos hombres, abuso sexual con un 0,5 % (n=1) de los cuales 1 caso fueron mujeres y 0 caso en hombres, seguido de violencia sexual en conflicto armado 0,5% (n=1) de los cuales 1 caso fue en mujer. Ver grafica 13.

Gráfica 13. Distribución de casos de las formas de violencia según sexo reportadas al SIVIGILA. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 16. Año 2017.


3.7 RELACION VICTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA

Al referirse a la persona quien comete el daño a la víctima, se habla del grado de parentesco con esta, se encuentra que “Ninguno” es la que más realiza algún tipo de violencia hacia la víctima con un 23 % (n=44), seguido por madre con 17 % (n=33), pareja con 17 % (n=32), familiar con 10 % (n=19), Expareja con 8% (n=15), padre con 7% (n=13). Como se muestra en la gráfica 14.





Gráfica 14. Relación víctima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 16. Año 2017.

3.8 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR.

De los agresores quienes cometieron algún tipo de Violencia hacia las víctimas utilizaron elementos como: Sin dato 65 %, contundente, corto contundente con un 24%, otros mecanismos con 8,1%, cortante y cortó punzante con 1,6%, ahorcamiento con 1,1%, caídas con 0,5%. Como se muestra en la gráfica 15.

Gráfica 15. Relación víctima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 16. Año 2017.






3.9 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO. CORTE SEMANA 16 -2017

En cuanto al escenario de los hechos se encontró que la vivienda es el lugar donde más se presenta violencias con un 67% (n=126) en comparación con los demás lugares, seguido de Vía pública 13% (n= 25), Otros con 10%(n=19), espacios terrestres al aire libre con 6,5 % (n=12), y centros educativos con 1,6 % (n=3). Ver gráfico 16.

Gráfica 16. Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 16. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 16. Año 2017.





CONCLUSIONES

- ✚ Las cifras de conducta suicida se muestran tendencias crecientes donde los municipios de Puerto Asís y Mocoa son donde más registros se encuentran notificados para este evento, y los municipios con mayor tasa de incidencia son: Valle del Guamuéz con 9.78 casos por 10.000 habitantes y Villagarzón 9.5, Orito con 5.20 casos por 10.000 habitantes, Mocoa 3.43 casos por 10.000 habitantes, Y Puerto Caicedo con 3.3 casos por 10.000 habitantes, superando a la tasa de incidencia de Putumayo que es de 2.77 casos por 10.000 habitante; entendiéndose que tasa de incidencia es número de casos nuevos en relación a la población riesgo presente en el municipio.
- ✚ El rango de edad que más casos se presenta conducta suicida y trastornos mentales en el departamento del Putumayo es de 15- 24 años de edad, en relación a el evento de conducta suicida el rango de edad se relaciona con la media nacional e internacional, De los cuales el método más utilizado en la población del departamento son intoxicaciones específicamente por aquellos medicamentos utilizados como insecticidas en los hombres y en mujeres medicamentos para el sistema nervioso central, evidenciándose además un aumento significativo en número de intentos suicidas en la población con 7% con ms de 4 intentos previos.
- ✚ Al analizar los factores desencadenantes se encontró que los problemas de pareja y económicos son los que mayor incidencia tienen en relación a conducta suicida; y de los cuales como método para realizar autolesión es intoxicación y arma corto punzante.
- ✚ De los trastorno mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas se encontró que se presentan desde los 10-14 años con 4 casos, 15-19 años de edad con 15 casos, de 20-24 años con 5 casos, de 20-24 años de edad con 5 casos, de 25-29 años de edad con 6 casos, 30-34 años de edad con 3 casos, 35-39 años con 1 caso; evidenciándose además que el Cannabinoides es el producto que más se presenta como SPA asociado a trastornos mental.
- ✚ En relación a Violencia de Género se evidencia que los Municipios de Mocoa, Puerto Leguizamo, Puerto Asís, es donde más registros se encuentran notificados para este tipo de evento; De igual forma las cifras corroboran que la vivienda son los lugares donde más se presentan este tipo de eventos; Si bien hay su registro, los datos aquí evidenciados proporcionan una imagen del situación que vive el departamento en cuanto a este fenómeno; donde las tendencias advierten que la violencia de genero especialmente hacia la mujer y contra los niños y las niñas está latente, mostrando que el grupo etario donde más se presentan estos eventos son de 10-14 años, seguido de 0 a 4 años.
- ✚ Al realizar el análisis de quien comete el daño a la víctima, se habla del grado de parentesco con esta se encuentra que **Ninguno** Es la que más realizan algún tipo de violencia hacia la víctima con un 23%, seguido por madre y pareja con 17%, y familiar con





10%; En cuanto al mecanismo utilizado por partes de los agresores fueron elementos: contundente, corto contundente con un 24%, otros mecanismos con 8,1%, cortante y cortó punzante con 1,6%, ahorcamiento con 1,1%, caídas con 0,5%.

✚ Del escenario de los hechos se encontró que la vivienda es el lugar donde más se presenta violencias con 126 casos en comparación con los demás lugares, seguido de Vía pública 25 casos, Otros con 19 casos, espacios terrestres al aire libre con 12 casos, y centros educativos con 3 casos.

