

BOLETIN N°14


SEMANA 23

Conducta Suicida- Trastornos mentales- Consumo Alcohol/SPA- Violencias





“Poniendo el objetivo en las personas con problemas de salud mental como un grupo vulnerable” Michelle Funk



OBSERVATORIO

De salud mental Putumayo

observatorio.smputumayo@hotmail.com

Corte semana epidemiología 10, 2017 (1 de Enero a 10 de Junio)

Elaboró: Epidemióloga-Adriana Quistial Enríquez. Profesional Esp. Apoyo Observatorio Salud mental

Revisó: Sandra L. Chamorro M. Profesional U. Coordinadora Prioridades en Salud Pública





TABLA DE CONTENIDO

1. CONDUCTA SUICIDA, PUTUMAYO 2017	5
1.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA.....	5
1.2 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA	6
1.3 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA – SEXO.....	8
1.4 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SEGÚN FACTORES DESCENDENTES – SEXO	8
1.5 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE TRASTORNO PSIQUIÁTRICO RELACIONADOS A CONDUCTA SUICIDA	9
1.6 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANISMO CAUSAL.	10
2. TRASTORNO MENTAL.....	11
2.1 TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	15
2.1.1 CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL	
PUTUMAYO.	15
3. COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	18
3.1 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA.....	18
3.2 COMPORTAMIENTO SOCIO DEMOGRÁFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO PUTUMAYO 2017.	19
3.3 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN SEXO – RANGO DE EDAD	19
3.4 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN SEMANA	
EPIDEMIOLÓGICA. SEMANA-23-2017	20
3.5 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN PERTENENCIA	
ÉTNICA. SEMANA 23-2017	21
3.6 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA	
SEGÚN SEXO.....	22
3.7 RELACIÓN VÍCTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA	22
3.8 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR.....	23
3.9 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO.....	24
CONCLUSIONES	25



LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1. Distribución de tasas de incidencia casos de conducta suicida según municipio de notificación. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017. .	6
Gráfica 2. Distribución de casos de conducta suicida según partencia étnica. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.	8
Gráfica 3. Distribución de casos de conducta suicida según Factores desencadenantes. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.	9
Gráfica 4. Distribución de los factores de riesgo con intento suicida. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.	9
Gráfica 5. Distribución de los casos de conducta suicida según mecanismo causal y sexo. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.	10
Gráfica 6. Trastornos mentales según zona rural y sexo. Departamento del Putumayo 2017.	17
Gráfica 7. Distribución de tasas de incidencia casos de Violencia según municipio de residencia. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.	19
Gráfica 8. Violencia de género en el departamento del Putumayo según sexo-rango de edad, Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.	20
Gráfica 9. Comportamiento epidemiológico de tipos de violencia según semana epidemiológica. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.	21
Gráfica 10. Distribución de casos de violencia de genero según pertenencia étnica –sexo. Corte semana 23 Departamento del Putumayo 2017.	21
Gráfica 11. Gráfica 5. Distribución de casos de las formas de violencia según sexo reportadas al SIVIGILA. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.	22
Gráfica 12. Gráfica 6. Gráfico 6. Relación víctima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.	23
Gráfica 13. Relación víctima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.	23
Gráfica 14. Gráfica 8. Gráfico 8. Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.	24





LISTA DE MAPAS

Mapa 1. Intento de suicidio según municipio de residencia. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.....	5
Mapa 2. Trastorno mental y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Corte Mayo- 2017 Departamento del Putumayo 2017.....	15
Mapa 3. Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.....	18

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.....	7
Tabla 2. Distribución de intentos de suicidio según sexo. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.....	7
Tabla 3. Trastornos mentales. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2017.....	11
Tabla 4. Trastornos mentales según sexo. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2017.....	12
Tabla 5. Trastornos mentales de los tres rangos de edad con mayor prevalencia. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2017.....	13
Tabla 6. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo y rango de edad. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2017.....	16
Tabla 7. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo .Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2017.....	16






1. CONDUCTA SUICIDA, PUTUMAYO 2017

1.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA

En el presente año según información recopilada de fuentes como: SIVIGILA y Observatorio de Salud Mental (con corte semana epidemiológica 1 a la 23 del año 2017) con registro de las 11 IPS del departamento las cuales son : E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel, E.S.E Hospital José María Hernández, E.S.E Hospital Local De Puerto Asís, E.S.E Hospital Fronterizo La Dorada, E.S.E Hospital Pio XII, Ese Hospital Orito, E.S.E Hospital Sagrado Corazón De Jesús, E.S.E Hospital María Angelines, Ese Hospital Alcides Jiménez, Hospital Naval ARC Leguizamo de los cuales se obtuvo lo siguiente: 153 Casos con conducta suicida, y al analizar estos casos por Municipio de Notificación, Mocoa 23 casos , Puerto Asís con 23 casos, Villagarzón con 22 casos, Valle del Guamuéz 16 casos, Orito con 15 casos, San Miguel la Dorada con 14 casos, Puerto Guzmán 8 casos, Puerto Caicedo con 8 casos, Puerto Leguizamo 6 casos, Santiago 3 casos, Colon 3 casos, Sibundoy 3 casos, San Francisco 2 casos, Putumayo desconocido 1 caso, otros departamentos 6 casos. Ver mapa 1.

Mapa 1. Intento de suicidio según municipio de residencia. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 23 . Año 2017.

Al evaluar la tasa de incidencia según municipio de residencia del departamento del Putumayo se encontró:



Que en el municipio de Villagarzón se han presentado 15 casos por 10.000 habitantes, seguido de valle del Guamuéz con 11.2 casos por 10.000 habitantes, Orito con 9.7 casos por 10.000 habitantes, Mocoa con 5.3 casos por 10.000 habitantes, se encuentran por encima de la tasa de incidencia del departamento, el cual presenta 4.2 casos por 10.000 habitantes, por debajo de este se encuentran Puerto Asís con 3.7 casos por 10.000 habitantes, Puerto Caicedo 3,3 casos por 10.000 habitantes, Santiago con 2.8 casos por 10.000 habitantes, San Miguel (la Dorada) con 2.5 caos por 10.000 habitantes, Puerto Leguizamo 2.2 casos por 10.00 habitantes , Sibundoy con 2.1 casos por 10.000 habitantes, Puerto Guzmán con 1.5 casos por 10.000 habitantes, Colon y san Francisco por tener menos de 10.000 habitantes en sus municipios, se toma la tasa por 1.000 habitantes para no disparar la tasa de incidencia, por lo anterior, se encontró que en Colon se presentan 1 caso por 1000 habitantes , como lo muestra la gráfica Numero 1.

Gráfica 1. Distribución de tasas de incidencia casos de conducta suicida según municipio de notificación. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 23. Año 2017.

1.2 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA

Para corte semana 23, se sigue evidenciado un aumento paulatino de los casos de conducta suicida, evidenciándose el mismo histórico donde las mujeres presentan más casos de intentos suicida que los hombres; evidenciándose lo siguiente: 93 (60%) casos en mujeres, y 60 (39%) casos en hombres.

Con respecto al grupo de edad, y según sexo, el grupo etario donde más casos se presentaron fueron 15-19 años de edad y 20-24 tanto para hombres como para mujeres ; al evaluar el rango de edad de las mujeres que más se presentaron casos fueron: de 15-19



años de edad con un 44% (n=41), seguido de 20-24 años de edad con un 19.4% (n= 18), seguido de 10-14 años de edad con un 15% (n=14), los demás rangos se pueden evidenciar en la tabla número 1.

En cuanto a los hombres, el rango de edad que más prevalencia presenta es de 15-19 años con 35% (n=21), de 20-24 años con un 20% (n=12), seguido de 25-29 años con 16% (n=12), los demás rangos de edad se pueden evidenciar en la tabla 1.

Tabla 1. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.

Rango de edad	Mujeres	%	Hombres	%	Total general
10-14	14	15,1	1	1,7	15
15-19	41	44,1	21	35,0	62
20-24	18	19,4	12	20,0	30
25-29	9	9,7	10	16,7	19
30-34	5	5,4	2	3,3	7
35-39	5	5,4	2	3,3	7
40-44	1	1,1	6	10,0	7
45-49	0	0,0	2	3,3	2
50-54	0	0,0	3	5,0	3
55-59	0	0,0	1	1,7	1
Total general	93	100,0	60	100,0	153

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 23. Año 2017.

De los 62 casos reportados el 70 % (n= 44) no tuvieron intentos previos, 7y el 29 % (n= 18) presentaron al menos un intento, el 4 % (n=3) no tuvieron dato, según la distribución de numero de intentos previos, el primer lugar fue 4 intentos con 7 casos, (3 casos mujeres y 4 casos hombres), seguido de un intento previo con 6 casos, (3 casos mujeres y 3 casos en hombres), dos intentos con 3 (1 caso mujer y 2 casos hombres), tres intentos con 2 casos presentados en mujeres, sin dato se encontraron 3 casos como lo muestra la tabla 2.

Tabla 2. Distribución de intentos de suicidio según sexo. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.

Intentos	Mujeres	Hombres	Total General
Sin intentos previos	62	43	105
1	12	7	19
2	10	3	13
3	4	1	5
4	3	4	7
Sin dato	2	2	4
Total general	93	60	153

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 23. Año 2017.






1.3 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA – SEXO

La conducta suicida en relación con la pertenencia étnica, Se encontraron 18 indígenas, de las cuales son 7 mujeres y 11 hombres, 5 Afrocolombianos, 3 mujer y 2 hombres, otro 130 casos de los cuales 83 mujeres y 47hombres. Ver Gráfico 2.

Gráfica 2. Distribución de casos de conducta suicida según pertenencia étnica. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 23. Año 2017.


1.4 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SEGÚN FACTORES DESCENDENANTES – SEXO

En cuanto a los factores desencadenantes de los intentos suicidas del departamento del Putumayo notificados a SIVIGILA, se encontró lo siguiente:

Conflictos de pareja fue el factor que mayores casos desencadenó el haber realizado intento suicida con un 56, 2% (mujeres n= 45, hombres n=41), seguido de otros con 10,4% (mujeres n=12, hombres n= 4), problemas económicos 8.5% (mujeres n=8, hombres n=5), maltrato físico psicológico o sexual con 8% (mujeres n=12), muerte familiar 6.5% (mujeres n=7, hombres n= 3), enfermedad grave con 3,2% (mujeres n=3, hombres n=2), suicidio de un familiar 3,2%(mujeres n=4, hombres n= 19), problemas jurídicos con 2.6% (mujeres n=2, hombres n=2) problemas laborales 1% (hombres n=1), escolaridad 1% (hombres n=1). Ver grafica 3.




Gráfica 3. Distribución de casos de conducta suicida según Factores desencadenantes. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 23. Año 2017.

1.5 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE TRASTORNO PSIQUIATRICO RELACIONADOS A CONDUCTA SUICIDA

Gráfica 4. Distribución de los factores de riesgo con intento suicida. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 23. Año 2017.





En relación con los factores de trastorno psiquiátrico relacionados con evento de conducta suicida y según sexo se encontró lo siguiente:

Que el 7.8 % de los intentos suicidas presentaron Consumo de SPA, antecedentes familiares 7.2%, ideación Suicida persistente con el 22,2%, antecedente de violencia o abuso 3.3 % y antecedentes Psiquiátricos 11.1%, de los casos que presentaron antecedentes psiquiátricos, se encontró que se relacionaron con Trastornos depresivo el 15 %, trastorno bipolar 1.3 %, esquizofrenia , y el 68 % no presentaron datos 1%. Ver Gráfico 4

1.6 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANICANISMO CAUSAL.

Al realizar el análisis entre mecanismo causal y sexo a semana 23 de 2017 se evidencia que el método más utilizado para auto daño es la intoxicación representando el 76,5 % (n= 117), arma corto punzante 13,1%(n=20), ahorcamiento con 6,5% (n=10), otros mecanismos 2.6 % (n=4), lanzamiento al vacío 1,3% (n=2; en relación a mujeres y hombres se evidenció que las mujeres (60.78%) presentan más prevalencia con conducta suicida que los hombres (39.21%), con una diferencia de 21.56 puntos porcentuales por encima de los casos de los hombres. Ver grafica 5

Gráfica 5. Distribución de los casos de conducta suicida según mecanismo causal y sexo. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 23. Año 2017.





2. TRASTORNO MENTAL

En lo transcurrido del año según información recopilada de fuentes como: RIPS y Observatorio de Salud Mental con corte Mayo, con registro de IPS privadas y públicas del departamento del Putumayo se han registrado 1022 casos con trastornos mentales relacionados con depresión, ansiedad, trastorno psicótico, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno desarrollo, trastorno de conducta (desatención - hiperactividad-impulsividad), demencia, trastorno por uso de alcohol, trastorno por uso de drogas, epilepsia y autolesión; trastornos que fueron priorizados por la guía MHGAP guías de atención de trastornos mentales. Tabla N° 3

Tabla 3. Trastornos mentales. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2017.

TRASTORNO MENTAL	Total
AUTISMO ATIPICO	4
DELIRIO, NO ESPECIFICADO	2
DEPRESION POSTESQUIZOFRENICA	1
EPISODIO DEPRESIVO GRAVE	110
ESQUIZOFRENIA	105
TRASTORNO PSICOTICO AGUDO,	4
OTROS TRASTORNOS AFECTIVOS BIPOLARES	5
TRASTORNOS DE ANSIEDAD	216
OTROS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA	33
OTROS TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL EN LA NIÑEZ	30
OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE	169
OTROS TRASTORNOS MIXTOS DE LA CONDUCTA Y DE LAS EMOCIONES	3
OTROS TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	4
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR,	36
TRASTORNO COGNOSCITIVO LEVE	11
TRASTORNO DE ANSIEDAD DE SEPARACION EN LA NIÑEZ	1
TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD ANSIOSA (EVASIVA, ELUSIVA)	7
TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD EMOCIONALMENTE INESTABLE	2
TRASTORNO DE PANICO [ANSIEDAD PAROXISTICA EPISODICA]	10
TRASTORNO DELIRANTE	4
TRASTORNO DEPRESIVO DE LA CONDUCTA	1
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE,	18
TRASTORNO FOBICO DE ANSIEDAD, NO ESPECIFICADO	5
TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	160
TRASTORNO MIXTO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES	17
TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO, NO ESPECIFICADO	7
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS	7
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	20
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA	6
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	9



TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE OPIACEOS	2
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE OTROS ESTIMULANTES, INCLUIDA LA CAFEINA: INTOXICACION AGUDA	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE TABACO	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL:	11
Total general	1022

Fuente: RIPS y Observatorio de Salud Mental). Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte MAYO -Año 2017.

De los trastornos mentales nombrados en la tabla N° 3, los de mayor incidencia fueron trastorno de ansiedad con 216 casos correspondiente al 21%, otros trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje con 169 casos correspondiente a 16%, trastorno mixto de ansiedad y depresión con 160 casos correspondiente a 15%, episodio depresivo leve con 110 casos correspondiente a 10%, esquizofrenia con 105 correspondiente a 10%, los demás trastornos se relacionan en la tabla 3.

En cuanto al rango de edad, los tres rangos de edad que presentaron mayor prevalencia fueron: de 15-19 años con 29 casos, seguido de 25-29 años con 27 casos, en tercer lugar de 5-9 años; en cuanto a sexo, se logra evidenciar que se presentan más casos en mujeres con 55% (n=151) que en hombres con 44% (n=122), tal cual se muestra en la tabla 4.

Tabla 4. Trastornos mentales según sexo. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2017.

EDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL GENERAL
0-4	29	58	87
5-9	40	78	118
10-14	46	35	81
15-19	56	50	106
20-24	27	37	64
25-29	46	40	86
30-34	43	36	79
35-39	47	27	74
40-44	42	23	65
45-49	43	19	62
50-54	34	13	47
55-59	26	8	34
60-64	29	12	41
65-69	22	7	29
70-74	11	6	17
75-79	9	5	14
80-84	4	1	5
85-89	8	1	9
90-94		2	2
95-100	1	1	2
Total general	563	459	1022

Fuente: RIPS y Observatorio de Salud Mental). Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte Mayo -Año 2017.



Al revisar los trastornos mentales que se presentaron en los tres grupos de rango de edad con mayor prevalencia se evidenció lo siguiente:

Tabla 5. Trastornos mentales de los tres rangos de edad con mayor prevalencia. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2017.

RANGO DE EDAD	TRASTORNO MENTAL	TOTAL
0-4	AUTISMO EN LA NIÑEZ	1
	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD ESPECIFICADOS	1
	OTROS TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL EN LA NIÑEZ	3
	OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE	39
	TRASTORNO DE ANSIEDAD SOCIAL EN LA NIÑEZ	1
	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	42
TOTAL 0-4		87
5-9	AUTISMO EN LA NIÑEZ	2
	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	1
	EPISODIO DEPRESIVO, NO ESPECIFICADO	1
	OTRO TRASTORNO PSICOTICO AGUDO, CON PREDOMINIO DE IDEAS DELIRANTES	1
	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD ESPECIFICADOS	1
	OTROS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA	6
	OTROS TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL EN LA NIÑEZ	15
	OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE	27
	OTROS TRASTORNOS MIXTOS DE LA CONDUCTA Y DE LAS EMOCIONES	2
	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, NO ESPECIFICADO	1
	TRASTORNO DE ANSIEDAD, NO ESPECIFICADO	5
	TRASTORNO DE ANSIEDAD SOCIAL EN LA NIÑEZ	2
	TRASTORNO DE LA CONDUCTA INSOCIABLE	1
	TRASTORNO DE LA CONDUCTA, NO ESPECIFICADO	7
	TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD ANSIOSA (EVASIVA, ELUSIVA)	1
	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	34
	TRASTORNO FOBICO DE ANSIEDAD, NO ESPECIFICADO	2
TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	1	
TRASTORNO MIXTO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES	8	
TOTAL 5-9		118
15-19	DELIRIO, NO ESPECIFICADO	1
	EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	3
	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	8
	EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	1
	EPISODIO DEPRESIVO, NO ESPECIFICADO	3
	ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA	1
	ESQUIZOFRENIA PARANOIDE	4
	ESQUIZOFRENIA, NO ESPECIFICADA	2
	OTROS EPISODIOS DEPRESIVOS	1
	OTROS TRASTORNOS AFECTIVOS BIPOLARES	1
	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD ESPECIFICADOS	2
	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD MIXTOS	2
	OTROS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA	2
	OTROS TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL EN LA NIÑEZ	2
	OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE	3
	OTROS TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	1
	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO DEPRESIVO PRESENTE LEVE O MODERADO	1
	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO PRESENTE CON SINTOMAS PSICOTICOS	1





TRASTORNO COGNOSCITIVO LEVE	4
TRASTORNO DE ANSIEDAD , NO ESPECIFICADO	13
TRASTORNO DE ANSIEDAD, ORGANICO	1
TRASTORNO DE LA CONDUCTA LIMITADO AL CONTEXTO FAMILIAR	1
TRASTORNO DE LA CONDUCTA, NO ESPECIFICADO	3
TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD ANSIOSA (EVASIVA, ELUSIVA)	1
TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD EMOCIONALMENTE INESTABLE	2
TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	4
TRASTORNO DELIRANTE	1
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO DEPRESIVO GRAVE PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	2
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO LEVE PRESENTE	1
TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO DE TIPO DEPRESIVO	1
TRASTORNO FOBICO DE ANSIEDAD, NO ESPECIFICADO	2
TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	13
TRASTORNO MIXTO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES	2
TRASTORNO PSICOTICO AGUDO POLIMORFO, CON SINTOMAS DE ESQUIZOFRENIA	1
DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: ESTADO DE ABSTINENCIA	1
DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: INTOXICACION AGUDA	1
DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: INTOXICACION AGUDA	1
DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: SINDROME DE DEPENDENCIA	3
DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: USO NOCIVO	4
DEBIDOS AL USO DE COCAINA: SINDROME DE DEPENDENCIA	1
DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: USO NOCIVO	1
DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: USO NOCIVO	3
TOTAL 15-19	106
TOTAL GENERAL	311

Fuente: RIPS y Observatorio de Salud Mental). Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte Mayo -Año 2017.

- ✓ **0-4 años:** se encontraron 87 casos de los cuales, los trastornos que más incidencia presentaron fueron el de trastorno del desarrollo del habla y del lenguaje no especificado con 42 casos seguido de otros trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje con 37 casos.
- ✓ **5- 9 años:** se encontraron 118 casos de los cuales los trastornos de mayor incidencia presentaron fueron trastorno del desarrollo del habla y del lenguaje no especificado con 34 casos, otros trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje con 27 casos, otros trastornos del comportamiento social en la niñez con 15 casos.
- ✓ **15-19 años:** se encontraron 106 casos dentro de este rango de edad donde se encontraron los siguientes trastornos mentales con mayor incidencia, trastorno mixto de ansiedad y depresión con 13 casos, trastorno de ansiedad , no especificado con 13 casos.

Los demás trastornos mentales relacionados en estos grupos de edad se encuentran en la tabla número 5.






2.1 TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

2.1.1 CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Los trastornos mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas se encontraron 62 casos, según RIPS (corte Mayo) en el departamento del Putumayo; evidenciándose que los hombres presentan un 74% (47 casos) de trastornos mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas y en las mujeres un 24% (15 casos). Mapa 2.

Mapa 2. Trastorno mental y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Corte Mayo- 2017 Departamento del Putumayo 2017



Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Mayo. Año 2017.

En cuanto al rango de edad, se encontraron con afectación rangos de edad desde 10 a 14 años de edad en adelante;

De 10-14 años con 5 caso (1 hombre – 4 mujer) con una frecuencia de 8%, de 15 a 19 años de edad 18 casos (5 mujeres y 13 hombres) para una frecuencia de 29%, de 20 a 24 años con 13 casos (2 mujeres -11 hombres) con una frecuencia de 21 %, de 25 a 29 años de edad con 12 casos (2 mujeres y 10 hombres) con una frecuencia de 19%, de 30-34 años de edad con 4 casos (4 hombres) con una frecuencia de 6.45%, de 35 años en adelante se encontró menos frecuencias las cuales se evidencian en la tabla 6.



Tabla 6. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo y rango de edad. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2017

Edad	Mujeres	Hombres	Total general	%
10-14	4	1	5	8,06
15-19	5	13	18	29,03
20-24	2	11	13	20,97
25-29	2	10	12	19,35
30-34		4	4	6,45
35-39		1	1	1,61
40-44		2	2	3,23
45-49	1	2	3	4,84
50-54		1	1	1,61
55-59		1	1	1,61
65-70	1	1	2	3,23
Total general	15	47	62	100

Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte Mayo, Año 2017.

Al realizar una revisión de los diagnósticos del CIE10, se encontraron trastornos mentales y de comportamiento asociados al uso de: alucinógenos, cannabinoides, cocaína, múltiples; cuyas sustancias ocasionaron afecciones en las personas tipo: trastornos mentales y del comportamiento, intoxicación aguda, síndrome de dependencia, uso nocivo, estado de abstinencia, síndrome de dependencia, trastorno psicótico.

Al analizar a detalle se encontró que las sustancias psicoactivas causantes de más casos de **intoxicación aguda** fue con alucinógeno con 5 % (3Hombres), en cuanto al **estado de abstinencia** se encontraron que el uso de cocaína, presentaron una frecuencia de 5.0 %, a lo que equivalieron a 1 mujer y 2 hombres ; al referirse al **síndrome de dependencia** como trastorno mental y de comportamiento estuvieron: canabbinooides con 11 % (3 mujeres- 4 hombres), **uso nocivo** cannabinoides con un 11% (1 mujer y 6 hombres).

Los demás trastornos mentales causados por uso de sustancias psicoactivas se encuentra en la tabla 7.

Tabla 7. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo .Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2017.

TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SPA	Mujeres	Hombres	Total	%
ALUCINOGENOS: ESTADO DE ABSTINENCIA		1	1	1,61
ALUCINOGENOS: INTOXICACION AGUDA		3	3	4,84
ALUCINOGENOS: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO		1	1	1,61
ALUCINOGENOS: SINDROME DE DEPENDENCIA	1		1	1,61
ALUCINOGENOS: USO NOCIVO	1		1	1,61
CANNABINOIDEOS: ESTADO DE ABSTINENCIA	1	1	2	3,23
CANNABINOIDEOS: INTOXICACION AGUDA		2	2	3,23






CANNABINOIDES: SINDROME DE DEPENDENCIA	3	4	7	11,29
CANNABINOIDES: TRASTORNO PSICOTICO		3	3	4,84
CANNABINOIDES: USO NOCIVO	1	6	7	11,29
COCAINA: ESTADO DE ABSTINENCIA	1	2	3	4,84
COCAINA: SINDROME DE DEPENDENCIA	1	4	5	8,06
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: ESTADO DE ABSTINENCIA		1	1	1,61
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: ESTADO DE ABSTINENCIA CON DELIRIO		1	1	1,61
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: INTOXICACION AGUDA	1	1	2	3,23
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO		1	1	1,61
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: TRASTORNO PSICOTICO		1	1	1,61
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: USO NOCIVO		3	3	4,84
OPIACEOS: INTOXICACION AGUDA	1		1	1,61
OPIACEOS: TRASTORNO PSICOTICO RESIDUAL Y DE COMIENZO TARDIO		1	1	1,61
TABACO: ESTADO DE ABSTINENCIA	1		1	1,61
ALCOHOL: ESTADO DE ABSTINENCIA		1	1	1,61
ALCOHOL: INTOXICACION AGUDA		2	2	3,23
ALCOHOL: SINDROME DE DEPENDENCIA		3	3	4,84
ALCOHOL: USO NOCIVO	3	4	7	11,29
TOTAL GENERAL	15	47	62	100

Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. corte Mayo. Año 2017.

En el caso de la zona rural o urbana, se encontró que la zona rural presentaron más casos con 33 casos de los cuales mujeres fueron 7 casos y hombres 26 casos, en cuanto a la zona urbana se encontraron 29 casos de los cuales fueron 8 mujeres y 21 hombres como lo muestra la gráfica 6.

Gráfica 6. Trastornos mentales según zona rural y sexo. Departamento del Putumayo 2017



Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. corte Enero, Año 2017.






3. COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

3.1 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA

Al realizar el análisis de casos de violencia reportados al SIVIGILA semana 23 año 2017, se encuentran 295 casos; de los cuales 16 casos son de residencia del Huila, Amazonas, Caldas Nariño, y Cauca, los eventos con residencia en el departamento se evidenciaron de la siguiente manera: Puerto Asís 74 casos, Mocoa 45 casos, Valle del Guamuéz 37 casos, Puerto Leguizamo 25 casos, Puerto Guzmán 11 casos, Sibundoy y Orito 16 casos para cada municipio, Puerto Guzmán y Villagarzón 15 casos para cada municipio, Puerto Caicedo y San Miguel la Dorada 10 casos para cada municipio, San Francisco y Santiago 6 casos para cada municipio, Colón 4 casos, 3 casos correspondientes a Putumayo municipio Desconocido. Ver Mapa 3.

Mapa 3. Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental, Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 23 Año 2017

Al evaluar la tasa de incidencia según municipio de notificación de estos eventos en el departamento del Putumayo se encontró lo siguiente:

Que en el municipio de Puerto Asís se presentaron 12 casos por 10.000 habitantes, Mocoa se presentaron 10 casos por 10.000 habitantes, Puerto Leguizamo con 16 casos por 10.000 habitantes, Sibundoy se presentaron 11 casos por 10.000 habitantes, tasas de incidencia que se encuentran por encima de la tasa a nivel departamental la cual se encuentra 8,33 casos por 10.000 habitantes, por debajo de esta tasa de incidencia se encuentran






Villagarzón 7 casos por 10.000 habitantes, Valle del Guamuez 7 casos por 10.000 habitantes, Puerto Caicedo con 7 casos por 10.000 habitantes, Puerto Guzmán con 6 por 10.000 habitantes, Santiago con 6 casos por 10.000 habitantes, San Miguel la dorada con 4 casos por 10.000 habitantes, Orito con 3 casos por 10.000 habitantes.

En cuanto a Colon y San Francisco como son municipios que no superan los 10.000 habitantes, su tasa de incidencia se presenta por 1.000 habitantes para no inferir y no supra estimar el resultado, la cual corresponde a 1 caso por 1.000 habitantes para cada municipio; gráfica 7.

Gráfica 7. Distribución de tasas de incidencia casos de Violencia según municipio de residencia. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 23. Año 2017.

3.2 COMPORTAMIENTO SOCIO DEMOGRAFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO PUTUMAYO 2017.

3.3 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN SEXO – RANGO DE EDAD

De los 295 casos notificados al SIVIGILA en el departamento del Putumayo el 81% (n=239) fueron Mujeres y el 19% (n=56) fueron Hombres, evidenciándose claramente el maltrato hacia la Mujer putumayense; en cuanto al rango de edad, se evidencia diferencia tanto






en hombres como en mujeres en la presencia de mayor número de casos, en la cual se presenta lo siguiente:

Hombres: los tres grupos etéreos con mayor número de casos se encuentran de 0-4 años con 19 casos, de 5-9 años con 16 casos, de 80-84 años con 4 casos.

Mujeres: los tres grupos etéreos con mayor número de casos se encuentran de 10-14 años de edad con 66 casos, 15-19 años de edad con 34 casos, y de 0-4 años y de 5-9 años de edad con 24 casos para cada uno; los demás rangos se evidencian en la Gráfica 8.

Gráfica 8. Violencia de género en el departamento del Putumayo según sexo- rango de edad, Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 23. Año 2017


3.4 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN SEMANA EPIDEMIOLOGICA. SEMANA-23-2017

En el año 2017, con corte semana 23, de los 295 casos notificados por Violencia de Genero correspondientes al departamento del Putumayo, se Puede evidenciar picos más altos en las semanas 18, 13, 1 y 3; en comparación al 2016 se presentaron picos más altos en las semanas epidemiológicas 13, 15 y 18, al realizar la comparación entre el total de casos entre la semana 26 del año 2016 y 2017, se presentan 26 casos más en el año inmediatamente anterior a corte semana 23 del año 2017. Ver gráfico 8.





Gráfica 9. Comportamiento epidemiológico de tipos de violencia según semana epidemiológica. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 23. Año 2017.

3.5 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA. SEMANA 23-2017

En cuanto a la pertenencia étnica podemos encontrar, que el 14% son indígenas (30 Mujeres – 11 Hombres), 2 % son Afrocolombianos (5 Mujeres), 0,3% son ROM (1 Mujer) y 84 % otros (203 Mujeres - 45 Hombres). Ver Gráfico 10.

Gráfica 10. Distribución de casos de violencia de genero según pertenencia étnica –sexo. Corte semana 23 Departamento del Putumayo 2017



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 23. Año 2017.






3.6 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA SEGÚN SEXO

En relación a las formas de violencia se encontró que la mujer es violentada más con Violencia física con 96 casos, seguido de abuso sexual con 80 casos, negligencia y abandono con 36 casos, violación con 26 casos, otras formas de violencia como acoso sexual, violencia psicológica, violencia sexual en conflicto armado se encontraron en menos proporción como lo muestra la gráfica 11; en cuanto a los hombres a diferencia de las mujeres la forma de violencia que más se presentó fue negligencia y abandono con 29 casos, seguido de violencia física con 10 casos, acoso sexual con 9 casos, otros tipos de violencia que se presentaron para los hombres fueron violencia psicológica. Ver gráfico 11.

Gráfica 11. Gráfica 5. Distribución de casos de las formas de violencia según sexo reportadas al SIVIGILA. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 23. Año 2017.

3.7 RELACIÓN VÍCTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA

Al referirse a la persona quien comete el daño a la víctima, se habla del grado de parentesco con esta, se encuentra que "Ninguno" es la que más realiza algún tipo de violencia hacia la víctima con un 26 % (n=76), seguido por pareja con 19 % (n=56), madre con 18 % (n=53), familiar con 12 % (n=36), Sin información y Expareja con 7 % (n=22), esposo con 2 % (n=6). Como se muestra en la gráfica 12.



Gráfica 12. Gráfica 6. Gráfico 6. Relación víctima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 23. Año 2017.

3.8 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR.

De los agresores quienes cometieron algún tipo de Violencia hacia las víctimas utilizaron elementos como: Sin dato 64 %, contundente/cortocontundente con un 25%, otros mecanismos con 6,1%, cortante/cortópunzante/punzante con 2%, ahorcamiento con 2%, caídas con 0,7%. Como se muestra en la gráfica 13.

Gráfica 13. Relación víctima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 23. Año 2017.






3.9 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO.

En cuanto al escenario de los hechos se encontró que la vivienda es el lugar donde más se presenta violencias con un 70% (n=209) en comparación con los demás lugares, seguido de Vía pública 10% (n=31), Otros con 8,8%(n=26), espacios terrestres al aire libre con 6,4 % (n=19), y centros educativos con 1,7 % (n=5). Ver gráfico 14.

Gráfica 14. Gráfica 8. Gráfico 8. Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 23. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 23. Año 2017.





CONCLUSIONES

- ✚ Las cifras de conducta suicida se muestran tendencias crecientes donde los municipios de Puerto Asís y Mocoa son donde más registros se encuentran notificados para este evento; en cuanto a la tasa de incidencia se evidencio que para corte semana epidemiológica 23, el departamento presento 4.2 casos por 10.000 habitantes, de los cuales los municipios que superaron la tasa de incidencia departamental fueron Villagarzón con 15 casos por 10.000 habitantes, seguido de Valle del Guamuéz con 11.2 casos por 10.000 habitantes, Orito con 9,7 casos por 10.000 habitantes, y Mocoa con 5,3 casos por 10.000 habitantes ; entendiéndose que tasa de incidencia es número de casos nuevos en relación a la población riesgo presente en el municipio.
- ✚ El rango de edad que más casos se presenta conducta suicida y trastornos mentales en el departamento del Putumayo es de 15- 24 años de edad, en relación a el evento de conducta suicida el rango de edad se relaciona con la media nacional e internacional, de los cuales el método más utilizado en la población del departamento son intoxicaciones
- ✚ En cuanto a los factores desencadenantes se encontró que los problemas de pareja y económicos son los que mayor incidencia tienen en relación a conducta suicida; y de los cuales los trastornos mentales asociados con más intentos suicidas fue la ideación suicida previa y constante, trastorno depresivo.
- ✚ Con respecto a los trastornos mentales que más se presentan en el departamento del Putumayo relacionados con la guía MHGAP se encontró que trastorno de ansiedad fue el más predominante, junto con trastornos de desarrollo, seguido de depresión y esquizofrenia, evidenciando que los rangos de edades con mayor predominio de estos son de 5-9 años y de 15 a 19 años de edad
- ✚ Acerca de los trastorno mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas se encontró que hay consumo desde los 10 años de edad, con mayor prevalencia en edades de 15-24 años, y producto con que más llegan a consulta por IPs cannabinoides y alcohol
- ✚ En relación a Violencia de Género se evidencia que los Municipios de Mocoa, Puerto Leguizamo, Puerto Asís, es donde más registros se encuentran notificados para este tipo de evento; De igual forma las cifras corroboran que la vivienda son los lugares donde más se presentan este tipo de eventos; Si bien hay su registro, los datos aquí evidenciados proporcionan una imagen del situación que vive el departamento en cuanto a este fenómeno; donde las tendencias advierten que la violencia de genero especialmente hacia la mujer y contra los niños y las niñas está latente, mostrando que el grupo etario donde más se presentan estos eventos son de 10-14 años, seguido de 0 a 4 años.





- ✚ Al realizar el análisis de quien comete el daño a la víctima, se habla del grado de parentesco con esta se encuentra que **Ninguno** Es la que más realizan algún tipo de violencia hacia la víctima con un 23%, seguido por madre y pareja con 17%, y familiar con 10%; En cuanto al mecanismo utilizado por partes de los agresores fueron elementos: contundente, corto contundente con un 24%, otros mecanismos con 8,1%, cortante y cortó punzante con 1,6%, ahorcamiento con 1,1%, caídas con 0,5%.
- ✚ Del escenario de los hechos se encontró que la vivienda es el lugar donde más se presenta violencias en comparación con los demás lugares, seguido de Vía pública, espacios terrestres al aire libre y centros educativos.

