

BOLETIN N° 20

SEMANA 11 -2018

CONDUCTA SUICIDA, TRASTORNOS MENTALES, CONSUMO DE SPA/ALCOHOL, VIOLENCIAS.

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL PUTUMAYO-OBSERVATORIO DE SALUD MENTAL



SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL PUTUMAYO-OBSERVATORIO DE SALUD MENTAL



“El buen humor es síntoma de salud mental”

Dómenico Cieri



OBSERVATORIO

De salud mental Putumayo

observatorio.smputumayo@hotmail.com

Corte semana epidemiología 11, 2018 (1 de Enero a 17 de Marzo)

Elaboró: Epidemióloga-Adriana Quistial Enríquez. Profesional Esp. Apoyo Observatorio Salud mental

Revisó: Sandra L. Chamorro M. Profesional U. Coordinadora Prioridades en Salud Pública





TABLA DE CONTENIDO

1. TRASTORNO MENTAL.....	5
2.1 TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 8	
2.1.1 CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	8
2. CONDUCTA SUICIDA, PUTUMAYO 2018	11
2.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA.....	11
2.2 COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO Y SOCIAL DE CONDUCTA SUICIDA DEL DEPARTAMENTO. 12	
2.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA....	12
2.3 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA – SEXO.....	14
2.4 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SEGÚN FACTORES DESCENDIENTES – SEXO	14
2.5 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE TRASTORNO PSIQUIATRICO RELACIONADOS A CONDUCTA SUICIDA 15	
2.6 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANISMO CAUSAL.	16
3. COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2018.....	16
3.1 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA	16
3.3 COMPORTAMIENTO SOCIO DEMOGRAFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO PUTUMAYO 2017. 18	
3.3.1 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN SEXO – RANGO DE EDAD	18
3.2 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA 19	
3.3 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA SEGÚN SEXO 19	
3.4 RELACIÓN VICTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA	20
3.5 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR.....	21
3.6 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO.....	21
CONCLUSIONES	23



LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1.Trastornos mentales según zona rural y sexo. Departamento del Putumayo 2018.....	10
Gráfica 2 Distribución de tasas de incidencia casos de conducta suicida según municipio de residencia. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018 ...	12
Gráfica 3 Distribución de intentos de suicidio según sexo. Corte semana 11.Departamento del Putumayo 2018.	13
Gráfica 4. Distribución de casos de conducta suicida según pertenencia étnica. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018.....	14
Gráfica 5. Distribución de casos de conducta suicida según Factores desencadenantes. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018.	15
Gráfica 6. Distribución de los casos de conducta suicida según mecanismo causal y sexo. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018.....	16
Gráfica 7.Distribución de tasas de incidencia casos de Violencia según municipio de notificación. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018.	17
Gráfica 8. Violencia de género en el departamento del Putumayo según sexo-rango de edad, Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018.....	18
Gráfica 8. Distribución de casos de violencia de genero según pertenencia étnica –sexo. Corte semana 11 Departamento del Putumayo 2018.....	19
Gráfica 10. Distribución de casos de las formas de violencia según sexo reportadas al SIVIGILA. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018.....	20
Gráfica 11. Relación victima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018.....	20
Gráfica 12.Violencia de genero según mecanismo utilizado por el agresor. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018.	21
Gráfica 13. Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018.....	22

LISTA DE MAPAS

Mapa 1. Trastorno mental y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Corte Febrero Departamento del Putumayo 2018.....	8
Mapa 2. Intento de suicidio según municipio de residencia. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018.....	11
Mapa 3. Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018.....	17





LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Trastornos mentales. Corte Febrero. Departamento del Putumayo 2018. ...	5
Tabla 2. Trastornos mentales según sexo. Corte Febrero. Departamento del Putumayo 2018.	6
Tabla 7. Trastornos mentales de los tres rangos de edad con mayor prevalencia. Corte septiembre. Departamento del Putumayo 2018.	7
Tabla 8. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo y rango de edad. Corte Febrero. Departamento del Putumayo 2018.	9
Tabla 5. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo .Corte Febrero. Departamento del Putumayo 2018.	10
Tabla 6. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018.	13
Tabla 7. Distribución de los factores de riesgo de intento suicida con antecedente de Trastorno Psiquiátrico. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018.	15



1. TRASTORNO MENTAL

En lo transcurrido del año según información recopilada de fuentes como: RIPS y Observatorio de Salud Mental con corte Febrero con registro de IPS privadas y públicas del departamento del Putumayo se han registrado 196 casos con trastornos mentales relacionados con depresión, ansiedad, trastorno psicótico, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno desarrollo, trastorno de conducta (desatención - hiperactividad-impulsividad), demencia, trastorno por uso de alcohol, trastorno por uso de drogas, epilepsia y autolesión; trastornos que fueron priorizados por la guía MHGAP guías de atención de trastornos mentales. Tabla N° 1

Tabla 1. Trastornos mentales. Corte Febrero. Departamento del Putumayo 2018.

TRASTORNO MENTAL	TOTAL
AUTISMO EN LA NIÑEZ	1
DEMENCIA	1
EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	2
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	9
EPISODIOS DEPRESIVO	23
ESQUIZOFRENIA	32
OTRO TRASTORNO PSICOTICO AGUDO, CON PREDOMINIO DE IDEAS DELIRANTES	4
OTROS TRASTORNOS AFECTIVOS BIPOLARES	4
OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD ESPECIFICADOS	5
OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD MIXTOS	6
OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO PSICOLOGICO	2
OTROS TRASTORNOS DEPRESIVOS RECURRENTES	2
OTROS TRASTORNOS MIXTOS DE LA CONDUCTA Y DE LAS EMOCIONES	1
OTROS TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	1
OTROS TRASTORNOS PSICOTICOS DE ORIGEN NO ORGANICO	1
PSICOSIS DE ORIGEN NO ORGANICO, NO ESPECIFICADA	2
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	10
TRASTORNO DE ANSIEDAD, NO ESPECIFICADO	9
TRASTORNO DE ANSIEDAD DE SEPARACION EN LA NIÑEZ	1
TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	1
TRASTORNO DE ANSIEDAD, ORGANICO	1
TRASTORNO DE LA CONDUCTA, NO ESPECIFICADO	4
TRASTORNO DEL DESARROLLO PSICOLOGICO, NO ESPECIFICADO	1
TRASTORNO DELIRANTE [ESQUIZOFRENIFORME], ORGANICO	1
TRASTORNO DEPRESIVO DE LA CONDUCTA	1
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE ACTUALMENTE EN REMISION	1
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO DEPRESIVO GRAVE PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	1
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO DEPRESIVO GRAVE PRESENTE, CON SINTOMAS PSICOTICOS	1
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO LEVE PRESENTE	3



TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO MODERADO PRESENTE	3
TRASTORNO FOBICO DE ANSIEDAD, NO ESPECIFICADO	1
TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	43
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: INTOXICACION AGUDA	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: TRASTORNO PSICOTICO RESIDUAL Y DE COMIENZO TARDIO	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: SINDROME DE DEPENDENCIA	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: USO NOCIVO	3
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: INTOXICACION AGUDA	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: SINDROME DE DEPENDENCIA	3
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: SINDROME DE DEPENDENCIA	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: USO NOCIVO	3
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: INTOXICACION AGUDA	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: SINDROME DE DEPENDENCIA	2
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: TRASTORNO PSICOTICO	1
Total general	196

Fuente: RIPS y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte febrero -Año 2018.

De los trastornos mentales nombrados en la tabla N° 1, los de mayor incidencia fueron trastorno mixto de ansiedad y depresión con 43 casos correspondiente al 21.93%, esquizofrenia con 32 casos correspondiente a 16.32%, episodio depresivo con 23 casos con 11.73% los demás trastornos se relacionan en la tabla 1.

En cuanto al rango de edad, los tres rangos de edad que presentaron mayor prevalencia fueron: 15-19 años con 24 casos, de 20-24 años con 20 casos, y de 25-29 años con 22 casos los demás rangos de edad están relacionados en tabla 2

Tabla 2. Trastornos mentales según sexo. Corte Febrero. Departamento del Putumayo 2018.

Rango edad	Mujeres	Hombres	Total general
5-9	4	2	6
10-14	9	3	12
15-19	12	12	24
20-24	8	12	20
25-29	12	10	22
30-34	10	11	21
35-39	11	6	17
40-44	13	5	18
45-49	6	5	11
50-54	9	2	11
55-59	4	3	7
60-64	6	6	12
65-69	6	1	7
70-74	1	1	2



Rango edad	Mujeres	Hombres	Total general
75-79		4	4
80-84		2	2
Total general	111	85	196

Fuente: RIPS y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Febrero -Año 2018.

Al revisar los trastornos mentales que se presentaron en los tres grupos de rango de edad con mayor prevalencia se evidenció lo siguiente:

Tabla 3. Trastornos mentales de los tres rangos de edad con mayor prevalencia. Corte septiembre. Departamento del Putumayo 2018.

TRASTORNO MENTAL	15-19	20-24	25-29	Total general
EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	1			1
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	3		1	4
EPISODIOS DEPRESIVO	5	4		9
ESQUIZOFRENIA		7	5	12
OTRO TRASTORNO PSICOTICO AGUDO, CON PREDOMINIO DE IDEAS DELIRANTES			1	1
OTROS TRASTORNOS AFECTIVOS BIPOLARES	1			1
OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD ESPECIFICADOS			1	1
OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD MIXTOS	1			1
OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO PSICOLOGICO	1			1
OTROS TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS		1		1
PSICOSIS DE ORIGEN NO ORGANICO, NO ESPECIFICADA		1	1	2
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR		1		1
TRASTORNO DE ANSIEDAD , NO ESPECIFICADO		1	1	2
TRASTORNO DE LA CONDUCTA, NO ESPECIFICADO	1	1		2
TRASTORNO DEPRESIVO DE LA CONDUCTA			1	1
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE ACTUALMENTE EN REMISION	1			1
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO DEPRESIVO GRAVE PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS			1	1
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO DEPRESIVO GRAVE PRESENTE, CON SINTOMAS PSICOTICOS			1	1
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO LEVE PRESENTE			1	1
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO MODERADO PRESENTE			1	1
TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	5	3	2	10
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: INTOXICACION AGUDA			1	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: TRASTORNO PSICOTICO RESIDUAL Y DE COMIENZO TARDIO			1	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: SINDROME DE DEPENDENCIA	1			1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: USO NOCIVO	2	1		3
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: SINDROME DE DEPENDENCIA	1		1	2



TRASTORNO MENTAL	15-19	20-24	25-29	Total general
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: INTOXICACION AGUDA	1			1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: SINDROME DE DEPENDENCIA			1	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: TRASTORNO PSICOTICO			1	1
Total general	24	20	22	66

Fuente: RIPS y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Febrero-Año 2018.

A nivel general se encontró que los trastornos mentales con mayor incidencia fueron esquizofrenia y trastorno mixto de ansiedad y depresión, según los rangos de edad se encontraron:

- ✓ **15-19 años:** se encontraron 24 casos de los cuales los trastornos de mayor incidencia presentaron fueron episodio depresivo y trastorno mixto de ansiedad y depresión con 5 casos cada uno.
- ✓ **20-24 años :** se encontraron 20 casos dentro de este rango de edad donde se encontraron los siguientes trastornos mentales con mayor incidencia esquizofrenia con 7 casos y 5 casos de episodio depresivos
- ✓ **15-19 años:** se encontraron 22 casos dentro de este rango de edad donde se encontraron los siguientes trastornos mentales con mayor incidencia esquizofrenia con 5 casos


Los demás trastornos mentales relacionados en estos grupos de edad se encuentran en la tabla número 7.

2.1 TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

2.1.1 CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Los trastorno mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas se encontraron 18 casos, según RIPS (corte Febrero) en el departamento del Putumayo; evidenciándose que los hombres presentan un 83% (15 casos) de trastornos mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas y en las mujeres un 16% (3 casos). Mapa 1.

Mapa 1. Trastorno mental y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Corte Febrero Departamento del Putumayo 2018



Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Febrero. Año 2018.

En cuanto al rango de edad, se encontró que de 15-19 años con 33%, 20-24 años de edad con 23.4 %, de 25-29 años con 16 % los demás rangos de edad se encuentran la tabla 8.

Tabla 4. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo y rango de edad. Corte Febrero. Departamento del Putumayo 2018

RANGO DE EDAD	Mujeres	Hombres	Total general	%
10-14	0	1	1	5,56
15-19	1	4	5	27,78
20-24	0	1	1	5,56
25-29	1	4	5	27,78
30-34	1	2	3	16,67
35-39	0	1	1	5,56
40-45	0	2	2	11,11
Total general	3	15	18	100,00

Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Febrero. Año 2018.

Al realizar una revisión de los diagnósticos del CIE10, se encontraron trastornos mentales y de comportamiento asociados al uso de: alucinógenos, cannabinoides, cocaína, múltiples; cuyas sustancias ocasionaron afecciones en las personas tipo: trastornos mentales y del comportamiento, intoxicación aguda, síndrome de dependencia, uso nocivo, estado de abstinencia, síndrome de dependencia, trastorno psicótico.

Al analizar a detalle se encontró que las sustancias psicoactivas causantes de más casos de **uso nocivo** cannabinoides, múltiples y uso de otras sustancias psicoactivas con 3 casos para cada tipo de sustancias, **síndrome de dependencia**, alcohol 2 casos.



Los demás trastornos mentales causados por uso de sustancias psicoactivas se encuentra en la tabla 5.


Tabla 5. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo .Corte Febrero. Departamento del Putumayo 2018.

TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SPA	Mujeres	Hombres	Total
ALUCINOGENOS: INTOXICACION AGUDA	0	1	1
ALUCINOGENOS: TRASTORNO PSICOTICO RESIDUAL Y DE COMIENZO TARDIO	0	1	1
CANNABINOIDES: SINDROME DE DEPENDENCIA	0	1	1
CANNABINOIDES: USO NOCIVO	1	2	3
COCAINA: INTOXICACION AGUDA	0	1	1
COCAINA: SINDROME DE DEPENDENCIA	0	3	3
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: SINDROME DE DEPENDENCIA	0	1	1
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: USO NOCIVO	1	2	3
ALCOHOL: INTOXICACION AGUDA	0	1	1
ALCOHOL: SINDROME DE DEPENDENCIA	0	2	2
ALCOHOL: TRASTORNO PSICOTICO	1	0	1
Total general	3	15	18

fuelle: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secrertaria De Salud Departamental – Putumayo. corte Febrero . Año 2018.

En el caso de la zona rural o urbana, se encontró que la zona rural presentó más casos con 13 casos de los cuales mujeres fueron 2casos y hombres 11 casos, en cuanto a la zona urbana se encontraron 5 casos de los cuales fueron 1 mujeres y 4 hombres como lo muestra la gráfica 1.

Gráfica 1.Trastornos mentales según zona rural y sexo. Departamento del Putumayo 2018



Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secrertaria De Salud Departamental – Putumayo Febrero , Año 2018.




2. CONDUCTA SUICIDA, PUTUMAYO 2018

2.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA

En el presente año según información recopilada de fuentes como: SIVIGILA y Observatorio de Salud Mental (con corte semana epidemiológica 11 del año 2018) con registro de las siguientes IPS del departamento: E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel, E.S.E Hospital José María Hernández, E.S.E Hospital Local De Puerto Asís, E.S.E Hospital Fronterizo La Dorada, E.S.E Hospital Pio XII, Ese Hospital Orito, E.S.E Hospital Sagrado Corazón De Jesús, E.S.E Hospital María Angelines, Ese Hospital Alcides Jiménez, Hospital Naval ARC Leguizamo, se obtuvo la siguiente información en relación a intencionalidad suicida: 72 Casos con conducta suicida; en relación a los Municipio de residencia, se encontró lo siguiente: Puerto Asís 19 casos, Mocoa 10 casos, Valle del Guamuéz 9 casos, Villagarzón 8 casos Orito 7 casos, San Miguel (la dorada) 6 casos, Sibundoy 3 casos, Puerto Caicedo 2 casos, Puerto Guzmán 2 casos, Puerto Leguizamo 2 casos, Colon 1 caso, Santiago 1 caso, otros departamentos 2 casos. Ver mapa 2.

Mapa 2. Intento de suicidio según municipio de residencia. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 11. Año 2018.

Al evaluar la tasa de incidencia según municipio de residencia del departamento del Putumayo se encontró:

Que en el municipio de Villagarzón se han presentado a la fecha, 3.74 casos por 10.000 habitantes, seguido de Puerto Asís con 3.05 casos por 10.000, Mocoa con 2.24 casos por

10.000 habitantes, San Miguel la Dorada con 2.12 casos por 10.000 habitantes, se encontraron por encima de la tasa de incidencia del departamento del Putumayo, la cual es de 2.01 casos por 10.000 habitantes, por debajo de la tasa de incidencia de Putumayo se encuentra, Valle del Guamuéz con 1.68 casos por 10.000 habitantes, Puerto Leguizamo con 1.30 casos por 10.000 habitantes, Orito 1.25 casos por 10.000 habitantes, Sibundoy con 0.21 casos por 10.000 habitantes, Colon con 0.18 casos por 10.000 habitantes, Puerto Caicedo con 0.14 casos por 10.000 habitantes, Santiago con 0.09 casos por 10.000 habitantes, y Puerto Guzmán con 0.08 casos por 10.000 habitantes como lo muestra la gráfica Numero 2.

Gráfica 2 Distribución de tasas de incidencia casos de conducta suicida según municipio de residencia. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 11. Año 2018.

2.2 COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO Y SOCIAL DE CONDUCTA SUICIDA DEL DEPARTAMENTO

1.21 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA.

Para corte semana 11, se evidencia que las mujeres presentan más casos de intentos suicida que los hombres; evidenciándose lo siguiente: 41 (56%) casos en mujeres y 31 casos (43%).

Con respecto al grupo de edad, y según sexo, el grupo etario donde más casos se presentaron fueron 10-14 a 20-24 años de edad, tanto para hombres como para mujeres;



al evaluar el rango de edad de las mujeres que más se presentaron casos fueron: 10-14 años con 7 casos , de 15-19 años de edad con un 16 casos, de 20 -24 años de edad con 6 casos, de 25-29 con 2 casos, 35-39 años con 2 casos.

En relación a los hombres, el rango de edad que más prevalencia presenta es de 10-14 años con 4 casos, de 15-19 años con 8 casos, seguido de 20-24 años con 12 casos. Ver tabla Numero 6.


Tabla 6. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima.
Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018.

rango de edad	Mujeres	Hombres	Total general	%
10-14	7	4	11	15,28
15-19	16	8	24	33,33
20-24	6	12	18	25,00
25-29	7	3	10	13,89
30-34	1	0	1	1,39
35-39	2	1	3	4,17
40-44	1	0	1	1,39
45-49	0	1	1	1,39
50-54	0	1	1	1,39
60-64	1	0	1	1,39
70-75	0	1	1	1,39
Total general	41	31	72	100

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secrertaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 11. Año 2018.

De los 72 casos reportados el 72 % (n=52) no tuvieron intentos previos, el 15% (n= 11) tuvieron 1 intentos previos (mujeres n=6 y hombres n= 5), el 11% (n=8) tuvieron 2 intentos previos (mujeres n=6 y hombres n= 2) ,4 intento previo con 1.39% (n=1 hombre), como lo muestra la gráfica número 3.

Gráfica 3 Distribución de intentos de suicidio según sexo. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secrertaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 11. Año 2018.



2.3 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA – SEXO

La conducta suicida en relación con la pertenencia étnica, Se encontraron 9 indígenas, de las cuales son 4 mujeres y 5 hombres, 2 Afrocolombianos, 2 hombres, otro 61 casos de los cuales 37 mujeres y 24 hombres. Ver Gráfico número 4.

Gráfica 4. Distribución de casos de conducta suicida según pertenencia étnica. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 11. Año 2018.


2.4 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SEGÚN FACTORES DESCENDENANTES – SEXO

En cuanto a los factores desencadenantes de los intentos suicidas del departamento del Putumayo notificados a SIVIGILA, se encontró lo siguiente:

Conflictos de pareja fue el factor que mayores casos desencadenó el haber realizado intento suicida con un 50% (mujeres n=21, hombres n=15), seguido de maltrato físico con 11% (mujeres n= 6, hombres n=2), problemas económicos con 8.3% (mujeres n= 3, hombres n=3), problemas escolares con 2.8% (mujeres n=1, hombres n=1), enfermedades crónicas 1.4 % (hombres n=1). Grafica 5.



Gráfica 5. Distribución de casos de conducta suicida según Factores desencadenantes. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 11. Año 2018.

2.5 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE TRASTORNO PSIQUIATRICO RELACIONADOS A CONDUCTA SUICIDA

En relación a los casos de intentos suicidas con trastorno psiquiátrico de base, se encontró que de los 72 casos 21 (29%) presentó diagnóstico previo de enfermedad mental; de las persona con trastorno psiquiátrico asociados el más común es el trastorno depresivo. tabla número 7.

Tabla 7. Distribución de los factores de riesgo de intento suicida con antecedente de Trastorno Psiquiátrico. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018.

	Total general	Porcentaje sobre grupo	Porcentaje total
Trastorno depresivo	16	76,2	22,2
Trastorno de personalidad	2	9,5	2,8
Trastorno bipolaridad	1	4,8	1,4
Esquizofrenia	2	9,5	2,8


Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 11. Año 2018.



2.6 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANISMO CAUSAL.

Al realizar el análisis entre mecanismo causal y sexo a semana 11 de 2018 se evidencia que el método más utilizado para auto daño es la intoxicación representando el 72 % (mujeres n=33, hombres n=19), arma corto punzante con 20.8% (mujeres n=7, hombres n=8). Ver grafica número 6.

Gráfica 6. Distribución de los casos de conducta suicida según mecanismo causal y sexo. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 11. Año 2018.

3. COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2018

3.1 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA

Al realizar el análisis de casos de violencia reportados al SIVIGILA semana 11 año 2018, se encuentran 166 casos; de los cuales 12 casos son de residencia otros departamentos; los eventos con residencia en el departamento se evidenciaron de la siguiente manera: valle del Guamuéz con 28 casos Villagarzón con 24 casos, Puerto Asís 22 casos , Mocoa 21 casos, y Orito con 15 casos, Puerto Guzmán 13 casos, Leguizamo con 8 casos, Colon y Sibundoy 5 casos para cada uno, San Miguel 4 casos, Santiago 2 casos, municipio desconocido de Putumayo 1 caso. Ver Mapa 3.

Mapa 3. Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 11. Año 2018

Al evaluar la tasa de incidencia según municipio de notificación de estos eventos en el Departamento del Putumayo se encontró:

Que en el municipio de Villagarzón se presentaron 11.22 casos por 10.000 habitantes, Puerto Leguizamo con 5.85 casos por 10.000 habitantes, Valle del Guamuéz con 5.41 casos por 10.000 habitantes se encuentran por encima de la tasa de incidencia de Putumayo, la cual es de 4.63 casos por 10.000 habitantes, por debajo de esta tasa se encuentra Mocoa 4.48 casos por 10.000 habitantes, Puerto Asís con 3.85 casos por 10.000 habitantes, los demás municipios en menor tasa de incidencia se encuentran en la gráfica número 7.

Gráfica 7. Distribución de tasas de incidencia casos de Violencia según municipio de notificación. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 11. Año 2018.



3.3 COMPORTAMIENTO SOCIO DEMOGRAFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO PUTUMAYO 2017.


3.3.1 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN SEXO – RANGO DE EDAD

De los 166 casos notificados al SIVIGILA en el departamento del Putumayo el 873% (n=145) fueron Mujeres y el 12% (n=21) fueron Hombres, evidenciándose claramente el maltrato hacia la Mujer putumayense; en cuanto al rango de edad, se evidencia diferencia tanto en hombres como en mujeres en la presencia de mayor número de casos, en la cual se presenta lo siguiente:

Hombres: los tres grupos etéreos con mayor número de casos se encuentran de 0-4 años con 7 casos, y de 10-14 años con 3 casos.

Mujeres: los tres grupos etéreos con mayor número de casos se encuentran de 10-14 años de edad con 37 casos, 20-24 años de edad con 18 casos, 25-29 años con 16 casos, y 15-19 ; 30-34 años de edad con 14 casos para cada rango etario; los demás rangos se evidencian en la Grafica 8.

Gráfica 8. Violencia de género en el departamento del Putumayo según sexo- rango de edad, Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 11. Año 2018



3.2 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA

En cuanto a la pertenencia étnica podemos encontrar, que el 11.68% son indígenas (71 Mujeres – 14 Hombres), 1.51 % son Afrocolombianos (10 Mujeres – Hombre 11), 0,27% son ROM (1 Mujer – 1 Hombre) y 86.54 % otros (527 Mujeres - 103 Hombres). Ver Gráfico 8.

Gráfica 9. Distribución de casos de violencia de genero según pertenencia étnica –sexo. Corte semana 11 Departamento del Putumayo 2018




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 11.. Año 2018.

3.3 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA SEGÚN SEXO

En relación a las formas de violencia se encontró que la mujer es violentada más con Violencia física con 70 casos, seguido de abuso sexual con 57 casos, Negligencia y abandono 8 casos, violación con 5 casos y; en relación a los hombres a diferencia de las mujeres la forma de violencia que más se presentó fue negligencia y abandono con 12 casos, seguido de violencia física con 8 casos. Ver grafica10.

Gráfica 10. Distribución de casos de las formas de violencia según sexo reportadas al SIVIGILA. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 11. Año 2018.

3.4 RELACIÓN VÍCTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA

Al revisar el tipo de agresor familiar hacia la víctima, se encontró que, la pareja fue el mayor agresor como causante de violencia en las mujeres con un 33% (n=56), de agresores externos a familiar (ninguno) con un 24% (n=41), familiar y expareja con un 11% (n=18) para cada uno, madre y padre con un 3.6% (n=6) para cada uno, en relación a los hombres se encontró que la madre fue la mayor agresora con un 5.4% (n= 9), seguido de agresores externos a familiar (ninguno), con un 3.6% (n= 6), familiar con 2.4 % (n= 4). Ver grafica 11

Gráfica 11. Relación víctima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 11. Año 2018.



3.5 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR.

De los agresores quienes cometieron algún tipo de Violencia hacia las víctimas se encontró sin información 53%, seguido de contundentes/corto contundente con un 30.7%, Otros mecanismos 7.8%, ahorcamiento con un 2.4%, proyectil arma de fuego, Caídas, Cortante/ cortopunzante/Punzante con un 1.8% para cada mecanismo nombrado como se muestra en la gráfica 12.

Gráfica 12. Violencia de genero según mecanismo utilizado por el agresor. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 11. Año 2018.

3.6 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO.

A nivel general en relación al escenario de los hechos se encontró que la vivienda es el lugar donde más se presenta violencias con un 79 % (mujeres n= 119 y hombres n= 13); vía publica 9.6% (mujeres n=10 hombres n=6), otro con un 7.23% (mujeres n=11, hombres n=1), lugares de esparcimiento, establecimiento comercial, centro educativo con un 1% Ver gráfico 13.



Gráfica 13. Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 11. Departamento del Putumayo 2018.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 11. Año 2018.





CONCLUSIONES

El análisis de la situación de los eventos de salud mental los eventos que se incluyen en este boletín son: intento suicida, Violencia, para los eventos de trastornos mentales y consumo de SPA se emitirán a partir del siguiente boletín puesto que la información que se utiliza para el análisis de los eventos relacionados son como fuente RIPS; y hasta el momento no ha sido posible su recepción por un cambio de aplicativo que está realizando el instituto nacional de salud al programa SIVIGILA, por consiguiente al analizar el evento de Intento suicida y violencia en el departamento del Putumayo a semana epidemiológica 11 (1 de Enero a 17 de Marzo 2018) se encontró lo siguiente:

✚ Con respecto a los trastornos mentales que más se presentan en el departamento del Putumayo relacionados con la guía MHGAP se encontró que trastorno de ansiedad y depresión fue el más predominante, seguido de esquizofrenia y trastornos depresivos, evidenciando que los rangos de edades con mayor predominio de estos son de, 5-9 años, 10-14 y de 15 a 19 años de edad

✚ Acerca de los trastorno mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas se encontró que el rango de edad de mayor prevalencia en edades de 15-19 años, y 25-29 años de edad encontrándose sustancias como cannabinoides, cocaína, y el uso de múltiples drogas

✚ Las cifras de conducta suicida se muestran tendencias crecientes donde los municipios de Puerto Asís, Mocoa, Valle del Guamuéz, son donde más registros se encuentran notificados para este evento; en cuanto a la tasa de incidencia se evidencio que para corte semana epidemiológica 11, el departamento presento 2 casos por 10.000 habitantes, de los cuales los municipios que superaron la tasa de incidencia departamental fueron Villagarzón con 3.7 casos por 10.000 habitantes, seguido de Puerto Asís con 3.05 casos por 10.000 habitantes, Mocoa con 2.2 casos por 10.000 habitantes, San Miguel con 2.12 casos por 10.000 habitantes.

✚ El rango de edad que más casos se presenta conducta suicida en el departamento del Putumayo es de 15- 24 años de edad, de los cuales el método más utilizado en la población del departamento son intoxicaciones.

✚ En cuanto a los factores desencadenantes se encontró que los problemas de pareja, económicos, son los que mayor incidencia tienen en relación a presentar una conducta suicida y un 27% de los casos que presentaron intentos suicidas, tuvieron entre 1 -2 -4 intentos previos.

✚ En las cifras de violencia de Género muestran tendencias crecientes, donde en los Municipios de Valle del Guamuéz , Villagarzón y Puerto Asís , es donde más registros se encuentran notificados para este tipo de evento; De igual forma las cifras corroboran que





la vivienda son los lugares donde más se presentan este tipo de eventos; Si bien hay subregistro, los datos aquí evidenciados proporcionan una imagen de la situación que vive el Departamento en cuanto a este fenómeno; donde las tendencias advierten que la violencia de genero especialmente hacia la mujer y contra los niños y las niñas está latente, mostrando que el grupo etario donde más se presentan estos eventos son de 10-14 años.

✚ Al realizar el análisis de quien comete el daño a la víctima, cuando se habla del grado de parentesco, se encuentra que los victimarios que más realizaron agresiones es la pareja con un 34% (n=57), seguido de Ninguno con un 28% (n=47), familiar 13% (n=22), expareja con un 11% (n=19), madre con un 9% (n=15). como lo muestra la gráfica número 11.

✚ Al analizar el mecanismo utilizado por parte de los agresores fueron elementos como: sin información 53% (n=88), contundente, corto contundente con un 30.7% (n=51), otros mecanismos con 7.8% (n=13), ahorcamiento 2.4% (n=4).

✚ En relación al escenario de los hechos se encontró que la vivienda es el lugar donde más se presenta violencias con 132casos en comparación con los demás lugares, seguido de Vía pública 16 casos, Otros con 12 casos.

